


# 中 药 材 手 册



张家口专员公署商业局药材经理部編  
河 北 人 民 出 版 社







## 前 言

中藥有几千年的历史，它是我們祖先在长期向自然灾害作斗争的过程中，为了保护人們的身体健康与安全，为了延长寿命和繁荣民族而創造的。是我国宝贵的科学、文化遗产之一。它不仅过去对我国民族的生存和发展有过重大贡献，就是今天仍是我国人民治疗疾病的主要藥物。因此，普及祖国藥学知識，并使它发揚光大，这对维护人民身体健康、加速社会主义建設是有十分重大意义的。

我省地区辽阔、幅員广大，藥材蘊藏量极为丰富，盛产各种藥材。有些貴重藥材在全国著名（如：党参、黄芩等等）；有些藥材又是宝贵的工业原料，可以榨油、酿酒、制糖、造纸、作纖維、制作食品和副食品等，用途很广。据不完全统计全省約产四百余种，蘊藏四亿一千余万斤，年产四千余万斤，可挖潜力极大。如果充分利用这项资源，对人体强壮，保障生产和增加农民收入，发展和繁荣山区經濟有很大作用。因此，我們写了这本“中藥材手册”，目的是为了帮助我省藥农，藥材工作者及爱好者熟悉中藥材基本知識，了解我省藥物生长的形状、土名、产地、用途等概况。我們希望有更多的人重視自然资源，調查、研究和利用本地区资源，讓所有野草、树皮为人类造福。

“中藥材手册”，是在我省和各专所編中藥材收購手册的基础上，参考藥典和当代藥物学著作，由我部白鈴声、李景昌二同志編輯，并参考了有关文献，对全省各种藥材的收購与經營經驗，并

中科院植物所图书馆



S0022273

間短，藥材品種多，技術複雜，地區差別很大，再加編寫時間倉促，其中錯誤或不妥之處恐怕很多。希望讀者門後能够多提意見，以便修改。

編者



## 目 录

毛知母.....	1	紫 草.....	28
甘 草.....	2	葛 根.....	29
黄 芩.....	3	紫 参.....	30
公防风.....	4	白毛根.....	31
赤 芍.....	5	白头翁.....	32
黄 芪.....	6	薤 白.....	32
玉 朮.....	9	狼 毒.....	33
紫 菀.....	10	山豆根.....	35
祁牛膝.....	10	苦 参.....	35
白 芷.....	12	贯 众.....	36
青木香.....	13	漏 蘆.....	37
天花粉.....	14	地 榆.....	38
山 药.....	15	蘆 根.....	39
升 麻.....	16	丹 参.....	40
地骨皮.....	17	枣 仁.....	41
苍 朮.....	18	郁李仁.....	42
柴 胡.....	20	杏 仁.....	43
藜 朮.....	21	山桃仁.....	44
藜 本.....	21	薏 苡.....	45
党 参.....	22	五味子.....	46
沙 参.....	24	枸杞子.....	47
鲜生地.....	25	贯 蓂子.....	48
百 合.....	26	王不留行.....	49
远 志.....	27	牛蒡子.....	49
桔 梗.....	28	苍耳子.....	51

小茴香.....	52	桑枝 桑叶 桑皮.....	74
萊菔子.....	52	大薊 小薊.....	75
牽牛子.....	53	茵 陳.....	76
車前子.....	54	蒲公英.....	76
蛇床子.....	54	艾 叶.....	77
葶藶子.....	55	側柏叶.....	78
柏子仁.....	56	澤兰叶.....	78
菟絲子.....	56	五加皮.....	79
鳳眼草.....	57	黃 柏.....	80
款冬花.....	58	陳 皮.....	81
玫瑰花.....	59	白鮮皮.....	81
馬兜鈴.....	59	冬瓜皮 冬瓜子.....	82
瓜 萸.....	60	全 蝎.....	83
蒲 黃.....	61	五灵脂.....	86
槐花 槐米 槐角.....	62	鷄內金.....	87
灯 籠.....	63	牛苦胆.....	88
旋复花.....	64	牛 黃.....	88
瓜 蒂.....	64	豹 骨.....	90
麻 黃.....	65	刺猯皮.....	90
薄 荷.....	66	蛇 蛻.....	92
紫 苏.....	67	蟬 蛻.....	92
桑寄生.....	68	虵 虫.....	93
香 薷.....	69	蜂 房.....	94
紫花地丁.....	70	夜明砂.....	95
瞿 麦.....	71	紫河車.....	95
荆 芥.....	71	猪 苓.....	97
益母草.....	72	赭 石.....	98
		馬 勃.....	98



## 毛 知 母

毛知母俗名是羊須子草、大脚板子、媽媽草等(如图1)。

我省各地均产，保定、唐山、承德、張家口、石家庄等专区产量都很大。以保定专区的涞水、易县产的质量最好。我省蕴藏量約有一千余万斤，年产三百余万斤，产值三十余万元。

从毛知母的命名上，可以了解到它的叶细长，好象羊的胡子，长一尺左右，草綠色，在六、七月开紫白色的花，根在地下横长，象“錢串子”，周身多毛根（似黃絨毛），秋天結黑色尖形子。根就是毛知母。

毛知母最容易找，也好刨。春秋两季都能刨，春季由开

冻起，到清明节后苗高一寸左右；秋季由秋分起到地上冻止。山坡、地埂、道旁到处都能找到它。用鎬刨或用鉄锹挖，挖出后除去草秧，用手掰掉根須子，忌用剪子或刀削鉸，正象俗話所說：“知母好刨，就怕拔毛”，必須用手掰，刨采时，要注意保持原条，不要刨断或碰断。生在山上阳坡的皮細，毛根細黃；生在山上阴坡的皮粗，毛根粗黑，質量較次。除地势不同有区别外，土壤也有关系，生在黃土



图1 毛知母



地里的皮色黃、質細；生在黑土地里的，皮棕黑色、質粗。毛知母粘性大，含有淀粉，在工業上用途很大。如：造醋、釀酒、制漁舟粘合劑。

入藥系解熱、除邪氣、去浮腫的良藥。除治療發熱、口渴、心煩、水腫、干咳嗽等症外，對消炎、利尿、潤腸也有很大作用。

## 甘 草

甘草俗名是甜草根。

我省主要產區是張家口、承德兩專區的各縣，以張家口專區的宣化、涿鹿、陽原、商都等縣產量最大。我省蘊藏量約為百餘萬斤，年產五十萬斤，產值二十五萬元左右。

甘草在中藥材中地位很高，大部分中藥處方中都有它，因它性溫和，能調合百藥，號稱“國老”；又因它味甜、多

粉，又有俗名甜甘草或粉甘草。它多生長在山坡、地埂和大道兩旁，秧高二尺左右，葉很象棗葉，夏天開淡紫色花，花象小蝴蝶，它的根部就是甘草（如圖2）。

藥用部分



圖2 甘草

生產季節分為春秋兩季。春季由開凍到芒種；秋季由白露到地凍止。刨採時，要先把秧苗鏟去，挖至兩畝左右，看看須子是稀還是密，如果串的密

就是好草，可以繼續往下挖，千万不要伤条。挖出后仍保持原条不断，只去掉秧子和須子即可。从質量上看，張家口专区所产甘草外表深紅，掰开里面是黄白色，粉多筋少，皮細嫩，肉紧，有菊花心，折断时粉末有甜味，質量較好；承德专区所产質量稍次于張家口专区。春季所产不如秋季，春季因久冻春化，草皮发松，草身发糠；而秋季因浆多，皮紧根实，質最好。一般的甘草长一至二尺，粗細不同，最粗在五分以上。

甘草主要用于药用，同时还可作烟草的調味剂，作副食品的調料、糖等。目前国内外需要量很大，呈产不足銷的情况。

甘草为什么有这么多的用途呢？因为甘草里含有淀粉，蛋白，特別是5%至8%的甘草甜素，而且有特殊的甜味，經化驗証明，把甘草甜素溶解在一万五千分之一的水中，仍能覺到它的甜味，提炼后，它的甜度超过白糖甜度五十倍左右。因此，在高酱油中，調味剂，調料剂中，和紙烟中，加入少量甘草，味甜濃香。

入药为調合药性的特效药，可祛痰，鎮痛，通便，治咳嗽，咽喉发痒等，合上其它药物还可解毒。

## 黄 芩

黄芩俗名是空心草，黄金茶。

我省各地均产，以承德专区的隆化、圍場、青龙、平泉等县为主要产区，其它各专皆产。全省蘊藏量約有一千余万斤，年产約三百余万斤，产值九十万元左右。

黄芩秧高一尺左右，叶象柳树叶，相对而生，夏天开花，花系唇形紫色，花落結果，果中有圓形黑色子，根是棕



黃色，外有黑皮，很堅硬（如图3）。



图3 黃芩

黃芩生長在山地，一般情況是土坡條好，石坡疙瘩頭多。春秋兩季生產，春季在開凍後，到苗高三寸止刨採；秋季在白露後，到地凍止。用鎬刨出後，去苗，去杈子，去掉毛須和泥土（刨時要深，以免斷條）。黃芩最怕着水，如天氣有變化，要注意包打苫蓋，否則

着雨發綠。

黃芩是清涼性退熱、消炎劑。適合治療未受惡寒但發熱、嘔吐、下痢，心頭苦悶、肚疼、喉頭髮炎、肺炎等症，同時也有利尿、止血的功用。用小量作飲料，味苦，有健胃助消化的效果。

黃芩為國內外大量需要藥品，並大量遠銷於南洋群島，如按年產五百万斤計算，可給人民增加收入二百余万元。

## 公 防 風

公防風俗名是黃風，蘭根、屏防，銅雲等。

我省各地均產。張家口、承德兩專區的尚義、張北、沽源、古北口、豐寧等地產量大，質量好，具有“個肥大，菊花心明顯，鳳頭大，有旗杆，皮略粗呈棕黑色”等特點，俗稱“地道貨”，“口防風”，其它如：保定、唐山等專區所



产为山防风。全省蕴藏量约有九十多万斤，年产二十五万，产值七万余元。

防风有公、母的区别（雌、雄）。公防风秧高六至七寸左右，贴地向四外伸展，再转向上长，叶象芹菜叶，不窜台，夏天开白色五星小花（如图4）。公防风入药能用，母防风入药不能用。



图4 公防风

同时对眼红肿痛、发汗退热等症也很有效。

防风春秋两季都可生产，春季由开冻起，到小满止；秋季由白露起，到地冻止。多生长在山坡、地埂、地界上。用镐刨出后，去苗、去土、去掉蘆头即可。刨采时注意，凡有凤头的才是真正防风。

防风不仅国内大量需要，而且出口国外，极受国际朋友欢迎。防风系治“风”病良药，适用于驱散风湿、镇痛、伤风、感冒、头痛、身痛、关节痛等症，

## 赤芍

赤芍俗名是山赤芍和紅芍药花根。因系山芍药花根，皮肉皆呈赤色又野生于山坡沙土地里得名。

我省各地均产，以张家口、承德两专区的滦平、围场、沽源、赤城、龙关等县为主要产区。全省蕴藏量约为二百余万斤，年产五十余万斤，产值十万余元。

赤芍秧高一至二尺，叶为羽状复叶，尖顶，夏天开大朵

五瓣花，花很美丽，有紅色，有白色和紫色的，它的根就是赤芍（如图五）。



图5 赤芍

赤芍每棵根长三至五寸，最长一尺左右，粗二分到五分，细长，弯曲，有弹性，皮深赤色，切开看断碴系粉白色，无毒，微有香气，尝它稍微有点苦酸。春秋两季都能刨，春季从开冻到苗高五寸止（河北平原约为谷雨到小满）；秋季由白露到地冻止（河北平原约为立秋到寒露）。春季所刨品

质好，秋季质量较次。用镐刨出后，去掉须子，掰掉蘖头，随手将蘖头埋入土中，来年便从蘖头钻出嫩芽，保证来年生产。

赤芍是流通血脉，化除瘀血、解热的好药。它含有安息香酸，安息香酸对限制细菌生长，作食物防腐剂很有效。它还有兴奋作用，使血液流速加快，因此对治疗破除瘀血，调经止痛（如：妇女赤白带下及疮疡等），肚疼头晕，眼目红赤等有奇效。赤芍行销全国，并能出口国外，需要大量生产，国家如能每年收购一百万斤的话，能给山区农民增加收入四十万元。同时换取了外汇，保证了国内人民需要。

## 黄 芪

黄芪在我省主要产区是张家口专区的张北、沽源、崇礼、蔚县等地。即所谓我省北部坝上、坝下地带，蕴藏量约

为一百二十余万斤，年产十五万斤左右，产值七万五千余元。

黄芪在坝上产的俗叫“口芪”或“庫倫芪”，特点是头粗尾細身長；坝下产的近于草原俗叫“草边貨”。它的秧高二尺左右，多生于半阴半阳的山坡，有小叶卵圓形，莖和叶都有茸毛，开淺黄色小花，象蝴蝶，花落結豆角，角內有黑色扁平的小籽，它的根就是黄芪（如图6）。



图6 黄芪

黄芪根一般长二至三尺（坝上尚义县曾产芪王长九尺余）。春秋两季均产。春季由見苗起，到苗高四寸止；秋季由白露起到封冻止。用鐮刨一尺深左右，用黄芪鏟順根挖，用手拔出，去秧苗，去須根，去蘆头（去蘆头时为露出虎眼，要对准蘆头，注意用猛勁砍断，立求断碴齐洁）。芪根枯空心不得留过一寸，經晒七成干，分等捆成十斤把，十成干打成百斤捆。

黄芪是一种貴重的促进生理机能发展的药。它补充人体缺乏的而且有較大营养价值的葡萄糖、淀粉、蔗糖等。系强壮緩和剂，主治呼吸短促，脉大无力，自汗盜汗等症，同时对利尿促水肿、排毒疮膿毒，和貧血、糖尿症、发痰症也有很大效果。因此在国内外大量需要的情况下，呈产不足銷，近来各地已大量栽培（附黄芪的簡要栽培方法）。



## 張家口地区黃芪栽培經驗

黃芪是强身和止汗、利尿的主要药。特产于我省北部張家口地区，它的生产量約占全省90%以上。解放前多溺散于野，无人經營；解放后，經党和政府大力扶持，黃芪生产量逐年上升，1957年比1953年增加近一倍，但由于国内、外大量需要，仍然存在着供不应求的情况。因此，党和政府非常重视，特別在农业发展綱要頒布以后，大大地鼓舞药农，国家借給种子，指导生产，大量地培植了黃芪。

黃芪在張家口地区，适合于沙土或黃土地。它耐寒，怕涝，地經种黃芪以后，可以改变土質由生变熟和擋风，同时，管理簡單，用劳力少，收益大，五年內每亩可产黃芪六百斤，产值四百余元。

黃芪用种子繁殖长成的，选种时要采摘生长健壮、无病害之芪苗，作为留种用，秋后子实飽滿者摘下，装入袋內不使它受潮，准备秋季播种或来年春季播种。春秋播种时期在芒种前与亚麻或蕎麦等庄稼同时下种；秋播时期在白露前。下种时不宜过深和种胡蘿苳一样，通常多适合撒播，每亩地用籽二、三斤，熟地一斤半即可。撒播之芪苗中耕不便，要拔一、二次草，苗出土后要进行間苗，便利芪苗生长，一般株距在六——八寸，行距一尺左右，每亩約三千余株。黃芪由于多种在山坡黃、黑沙地带，一般在播种前将地上盖杂草烧灰翻入土中，底肥力大，中間不在施肥。黃芪抗力强、风、沙、汗、水（一般小水）均不怕，但防止牲畜蹂踏秧苗，以免产生黑心。采收期在白露后立冬前，粉多、質好，过早芪未成熟影响产量与質量，过迟块条根养份被消耗。每人每天能刨采三十——五十斤。

黃芪的幼苗頭一年長半尺左右，第二年長一尺左右，開花、結籽不長，三年始大量開花，畝產籽五——六斤。採子時，子與壳一同摘下，曬干後搓開，去掉壳，選種，種子易生蟲，可與灰拌起保存。五年貨可長直徑半寸左右，重八——十兩，畝產濕貨一千——二千五百斤，折干貨六——八百斤。

## 玉 朮

玉朮俗名叫黃雞蛋飯（黃鷄）、白豆子（黃精）。我省各地均產，以唐山、承德兩專區的遷西、灤平、青龍、豐寧等縣產量最大，全省蘊藏量約有四百餘萬斤，年產量七十萬斤，產值十四萬元左右。

玉朮秧高二市尺左右，葉如柳葉，頭尖銳，六、七月間開淡綠形的鐘形小花，象小鈴鐺，它的根形似鷄，黃白色（如圖7）。生長在半陰半陽的山坡或石頭縫中。春秋兩季都可刨採。春季由地皮開化起至見苗止；秋季由白露起到地凍止。用鎬刨出後，去掉秧苗和泥土（防止刨破了頭）。



圖7 玉朮

玉朮可以做補血、益氣、滋養強身的藥品，但又是制糖、造酒、造醋的好原料。入藥對病後衰弱及肺結核患者有顯著效果。因它含有70%左右的糖，可制糖稀、糖色，并可於糖稀中提制白糖，如果全省大量發展年產三百萬斤的話，除藥用五十餘萬

斤外，其餘二百五十萬斤都可用來制糖、醋和造酒，按對

成折算，能节省粮食一百二十五万斤左右，够二千五百万余人一年的吃粮。全年采集三百万斤，国家全部收购，农民可以增加收入一百二十余万元。

## 紫 菀

紫菀俗名小瓣儿。

产于我省保定、承德两专区，以保定专区安国为主要产区，系栽培品种，年产六十余万斤，产值十八万元左右。

紫菀秧高一至二尺左右，春天出苗，叶交叉长着，椭圆形，秋末开黄色花，根红紫色，就是紫菀（如图8）。



图8 紫菀

紫菀春冬两季生产。春季开冻到生芽前；冬季由立冬到封冻。春秋质量无大差别，目前产区药农习惯春季生产。刨采时需要先用水浇地使它阴湿，用三齿刨，去秧苗，去泥沙，把黄白色的粗根和带节的母根（即主要茎根）区别开，挑出母根，作来年种根，把须根编成小瓣，随编随打土，晒干即为成品。

紫菀是润肺、止咳嗽、祛痰的良药。对慢性咳嗽、虚弱性咳嗽、肺癆咳嗽、咳嗽带血、小便带血等病症效果显著。它是全国人民所需要的又有很大出口量的品种。亩产紫菀四百至一千二百斤，按平均六百斤计算，每亩价值二百余元。

## 祁 牛 膝

牛膝是河南、怀庆山上长的一种多年生的草根。由于它



的根节膨大，好象牛的膝盖，故名牛膝。祁牛膝系“祁州”即现在的安国县产物，从河南、怀庆地区移植的，以产地命名祁牛膝。安国年产三万余斤，产值一万二千余元。

牛膝在春天出苗，秧高三至四尺，方便，长圆形的叶，象蛋子，夏天开绿色小花，排列成穗状花序，秋天结椭圆形小胞果，有刺毛（如图9）。



图9 祁牛膝

牛膝生活在风凉高燥地方，水位低，沙土或沙黄土中，怕碱地及前茬蔓青、蘿苣地。每年立冬到小雪经严霜过后，叶子干枯，开始收获，如果过早尚未达到成熟，过晚根部必然变质发紫。刨采时，靠畦的一边挖一条沟，宽一点五尺到二尺，深度看牛膝扎的根深浅而定，一般深在三至四尺，轻轻向下刨挖，以保持膝根原条不断，这是一项较为

细致的工作，需要预备一些小工具，仔细的从泥土中掏出根来，抖去膝身上的土，晒干，进行挑选，分好次以头整齐捆成一至一点五寸的小把，长约一至二尺，外皮灰黄色，断碴，棕黄色，心黄白色，皮层部有黄白色小点，味稍有甜中带苦。

牛膝是通经、利尿、补养肝肾、强筋益骨的良药。它能活动经络，治经闭不来，生产孩子以后，恶露未净血结致肚疼，散去恶血；它能使肝肾得补，骨健气足，经络动，血液冲寒湿而恢复原状，治小便不通，脚气、关节炎等，使腰腿肌肉强健。但，牛膝善于促使下部经络活动，有强精之

效。忌孕妇和专用补品。

牛膝每斤值价一元多，它系国内外所需药品，远销到南洋群岛和日本，为国外人民大量应用，在生产上目前仍呈产不足销，必须多生产，才能增加国内需要，大量出口，换取外汇，扩大人民收入。

## 白 芷

白芷是一种名贵的香料，也是药材。

我省只有保定专区安国县在进行大量栽培，近来望都、定县亦有少量生产。年产量约五十万斤，产值二十五万元左右。

白芷系自生于山野或家中栽培，我省主要生产依靠栽培。白芷秧高三尺左右，梗上密生茸毛，紫色。夏天，顶上开小白花，它的根就是白芷（如图10）。



图10 白芷

白芷适宜黄沙土，于每年清明、秋分前后播种两次，春播秋季处暑收获，秋播来年小暑产新。每亩产五至八百斤。收获时，叶子变黄并带有干点，就可动手，先把秧子割去，然后在垄的一旁刨一尺深沟，再刨白芷（挖沟好刨不伤根），刨回后，去土，晒干。但刨采时应当注意，天要好，最好在晴天，适合

收获期，刨回后勤晒勤翻。

白芷是祛痰、散风、止痛剂，对人的血管、呼吸、神经等中枢有兴奋作用，专治神经头痛，长期偏头痛，咳嗽痰

多，鼻子流涕，眼疼流泪，妇女赤白带下，慢性潰瘍等均有效。同时，白芷是配作香料的原料之一，国内外皆呈产不足銷，每亩收入較大，約三至六百元，收入較大，但技术性强，不易栽培。

## 青 木 香

木香是香港、云南、四川等地生长的一种野生植物，长的象木头但带有香的气味，命名木香。我省所产的是青木香，也是木香的一种，俗称土木香，系人工栽培，因它带有青香气味，叫青木香。

我省只安国县一地栽培生产，年产一万余斤，产值四千余元。

青木香的秧高五寸多，梗上长着密密麻麻的短茸毛，生有椭圆形的叶，叶柄长，常常抱住梗，夏天开黄色头状花，根的外皮紅黑色，晒干后用作药材（如图 11）。收获时，



图11 青木香

用镰刀割去地上的秧、梗叶，用铁三齿镐刨出根，摘掉根须子，把叉根截成三至五寸一节，头部疙瘩头不易晒干，可劈成几瓣。在刨时注意不要刨断或碰伤，要保持整根，头部的疙瘩头系老根，用它做种子，保证来年扩大生产。安国县农民多将根放入窖内，留待次年清明作种秧。

青木香是一种名贵的药材，同时也是上好的香料。因为它含有大量土木香粉和蜡质，挥发油



等化学成份，芳香无毒，是化气滞，舒肝快胃，流行时疫病的好药。它主治一切气痛，停食积聚，胸满腹胀，肝胃不舒等症，同时对瘧疾、霍乱(結核性)、痢疾、慢性腸炎、百日咳和解毒药等症状有很大功效。并可用它熏屋及外科防腐剂。

青木香配成舒肝丸，专治由于食物积聚气道間（即腸胃中），致心腹疼痛，飲食减少，消化不良，肝胃不舒；配成香連丸治痢疫等症。

木香过去我国有很大一部分依靠进口（从印度叙利亚等地）有番木香之說，为了满足需要，对于发展国产木香是有巨大意义的。一方面可以减少外汇，满足国内日異增长的需要，另一方面由于木香价值較高，需量很大（四至五元一斤），可以增加农民收入。同时，我省所产青木香在国内威信极高，暢銷内蒙、京津、西北、东北、华北等地，产不足銷。

## 天 花 粉

天花粉，俗名是花粉、瓜蒌根（如图12）。

我省邯鄲专区的磁县、武安、临漳、涉县等地均产。年产五万斤，产值二万五千元左右。

天花粉系瓜蒌的根，有的家种，有的野生于山坡上。它在春秋两季进行收获。春季由春分到清明，秋季由霜降到封冻，以旧历九、十月新生产的为最好。瓜蒌根用鐮刨出后，掰掉秧苗，截成五至八寸的小节，由于瓜蒌根



图12 瓜蒌

粗細不等，粗而大的可用刀破成兩半或三半。我省所產瓜萆根磁實體重，色發白亮，粉性大，與河南省安陽特產地貨相同。

瓜萆根，無香氣，味苦微酸，在口中嚼碎成粉末狀，沒有柴。系生津、利尿、催乳的藥，它含有大量的淀粉，對胃熱煩滿，消渴、濕疹、皮膚病等也有很大功效。目前國內很需要它，我省每年要支援省外一部分，也適宜栽培，每畝產約三千餘斤，每斤價值五角左右，每畝地收入一千五百餘元。

## 山 藥

山藥俗名是長山藥。因古時產於山中，經後人移植引種才逐步大量生產得名山藥，由藥及於食的。

山藥在我省各地均有栽種的，以保定專區安國縣產量最大，而且有悠久的加工歷史經驗，因此該縣所產較為地道，由於產量大，用於藥用方面的山藥僅四、五萬斤。

山藥同屬於薯類作物，它的秧習慣盤卷在架上或其它植物上，秧細長，長橢圓形的葉，對生，有長柄，好象心臟一樣；全身深綠色，夏天，從葉的分枝上，滋生出好象穗子一樣的花序，開白色花（雌、雄不分），結裂果，長小山藥蛋，它的主根就是山藥。根粗大細長，約二至三尺，小山藥蛋不規則球狀，皆為優美食料。

山藥每年霜降到立冬期間收穫。收穫時，先將地面上所搭的叉字形架（竹竿或高粱杆搭成，架高六至七尺）及纏繞在架上的秧統統去掉，再順畦壟開一深溝，溝的深度要依據山藥的長短而定，大約在三尺左右，隨後用鎬向山藥根搜刨，這樣很容易掘出，但要注意切勿折斷，保持原條，去掉

泥土即可。

山藥的加工方法很簡單。立冬后，用小刀或鉄片卷成的刮刀，把山藥薄薄的一层外皮刮去，刮淨皮后，晚上放在露天，使其冻实，第二天晾至化冻，擰掉水分再放入土坯洞里，用硫磺熏二、三小时，色发白时取出晾晒，晒至四至五成干的时候，用搓板揉成直条，晒至六至七成再搓，搓到将返浆时，再晒，晒到七至八成时再揉，直到条直、身圓、色白、光亮为止，将长条截成五至七寸长的一节，晒十成干，即为光条。如果不加工光条，刮皮經熏后，經冻晒成干即可。

山藥是对人身体补益很大的藥品。它含有特种蛋白和淀粉等化学成分，滋潤人的五脏，强壮人的体質，可帮助消化（据临床实验証实，三小时内，由于特种淀粉的原因，可消化五倍于它的淀粉），治疗虛弱，消化不良，慢性腸炎和糖尿病，特別对腎虛、遺精、健忘、虛劳瘦弱有显著效果。除入藥外做各种食料也很好，久食对体質发育有很大好处。

## 升 麻

俗名苦菜根，龙牙菜根。

我省各地均产。以張家口专区崇社礼、龙关、赤城等县产量最大。全省蘊藏量約为一百二十万斤，年产三十万斤，产值十万元左右。

升麻秧高二至三尺，叶象大麻子叶，有鋸齿，夏天頂上开白色花，远看好象麦穗，根好象猪屎，色黑，須子很多，就是升麻（如图13）。

升麻在主产区很容易刨。在春秋两季內生产。春天由开冻起，到苗高二至三寸止。秋季由白露起，到地冻止。多生





药用部分

图13 升麻

长在山野阳坡桦树林中。用鎬刨出后，去苗，去杈子，去泥土，进行简单的加工，加工后即为成品。农民的加工方法极为简单，有以下三种：

**刮：**用镰刀把毛须全部刮净。

**剪：**用剪刀把毛须全部剪去，但没有镰刀刮的干净，留下很多短楂，不整洁。

**燎：**农民在山上刨出升麻后，随手扔在坑边晾晒，再刨别的，下山以前，把晒干的升麻收起来，担些山柴下山，将升麻放在山柴上火点着，随燎随翻，有经验的农民，一般是山柴完了毛须也燎净了。

升麻是一种退热、解毒、消炎良药。治麻疹、痘花、肠伤寒发烧、花毒、口腔发炎、扁桃腺发炎等病有显著效果。

## 地 骨 皮

地骨皮俗名“枸杞根”，是一种落叶灌木的根皮。我省各地均产，以张专的蔚县、阳原等县产量较大。全省蕴藏量约二十万斤，年产量约五万斤，价值约二万元。

它的秧高约二尺左右，小枝长的很密，枝上有刺，叶是长扁圆形，夏天从叶把的地方开花，浅紫色，秋天结果，果实熟了以后为鲜红色，是一种扁圆形的浆果，药名叫“枸杞子”，它的根皮就是“地骨皮”（如图14）。生长在山地向阳的坡上。

刨采地骨皮的季节分春秋两季：春季由开冻起，到绿叶



图14 地骨皮

长齐止；秋季由立秋起，到地冻止。用镐刨出根后，去掉秧子，用木棒趁湿砸根，砸至皮离骨，将骨抽出，只要根的皮，然后把夹杂物挑净，将皮晒干即可。

地骨皮有降低血糖的作用，治糖尿病，并可用于肺结核病的潮热，还可止咳。

## 苍 朮

苍朮秧高一尺多，叶是扁圆形，有刺，有锯齿，秋天开白色或红色花，其主根之疙瘩即苍朮。生长在半阴半阳的土坡上，每年春天或秋天都可刨采。在我省蕴藏量极大，系我省大宗产品，实蕴藏量约二千五百余万斤，每年产量在一千万斤以上，产值九十万元左右，我省承德、张家口、保定、邢台均是主要产区。

苍朮是一种极有价值的野生植物，它含有挥发性精油和维生素。①能从苍朮中提炼出2%至3%的苍朮油，每市斤值价二十五至三十元，出口或国内销路都很大，需要多量生产，油不仅能作香料用，还能作机器润滑油（精密机器用）。油饼可作化肥。②用苍朮治病，象系固肠、健胃、发汗、芳香剂，对肠子吸收食物能力减退，致发生久泻不止，它起强化肠子吸收力的作用，有显著效果；同时治消化不良、头

痛、浮肿、发汗、止汗等症，除作香料（还能提油）外，室内焚烧祛湿气，消毒、杀菌。更突出的是苍朮是一项宝贵的化肥。以上是一般用途的三点介绍更重要的是：苍朮除药用还是很好地肥源。

苍朮怎样造肥呢？我省可利用的价值多大？我省如采取就地生产就地加工的办法，每斤苍朮可生产五十斤人粪尿，如按八百万斤制肥计算，可增加人粪尿肥四亿斤，这个数字投入到农业生产中，对支援农业生产大跃进将起到巨大作用。过去有人怀疑苍朮的效力，谈它没有“科学性”，是“土办法”，经省农林厅鉴定，苍朮本身含有氮0.16%，磷0.22%，钾0.81%，它对植物生长有很大作用，突出地是它在土壤中，能促进氮细菌的生长，从而又能增加细菌肥料。制作方法极简单，苍朮肥的原料主要有三：苍朮、硫酸铵和水。苍朮一斤粉碎后，加入十斤硫酸铵，加五十斤水（温水）充分捣碎，搅匀，再倒入缸或水桶中，严密封闭十至十八天，经发酵后，原苍朮肥（原液）。使用时，每重斤苍朮肥原液加五十斤水即可。

这是我省一项宝贵财富，希望有更多的人，采制，使用。这种肥最适合小麦、棉花、和麻等作物，每亩用量一千至一千五百斤，点施或泼施（如：小麦在二、三月发棵期内，秧苗生长到二至三寸时使用（如图15）。



图15 苍朮



## 柴 胡

柴胡俗名叫山根菜、黑柴。

我省各地均产。以保定专区涞水，易县，涞源等地所产个大，色紫、皮细，质量好，在中药行业中叫它“西陵柴胡”。其它地区较次。我省蕴藏量约为八百万斤，年产一百五十万斤左右，产值三十七万元左右。

柴胡秧高二尺左右，叶窄长好象竹叶，夏天开黄色小碎花，象一把小伞，它的根长一——三寸，有须，即柴胡（如图16）。



图16 柴胡

它生长在山地阴坡，湿性荒地上。春天秋天都可刨采。春天从化冻到苗高四——五寸止；秋天从处暑到地冻止。用镐刨出后，去苗，去泥土，净剩根。根有红根，有黑根，要分开。

柴胡在国内、外需要量都很大。为出口品种。在国内它作清凉性解热要药。治疗往来寒热及疟疾有显著效果。柴胡可提炼“柴胡素注射液”，方法很简单，就是把柴胡捆成小把，放在蒸馏器

内，通过高温蒸馏，过滤，灌入预先准备好的瓶内，封口，消毒，检验就成为成品。这种药系解热、镇静良药。

## 藜 苳

俗名小渠霜、攪根子、左扭、烂四股草等。

我省各地均产，以張家口、保定专区的蔚县、涿鹿、赤城、易县、涞水、涞源等地为主要产区。質量以張家口专区的好，枝条肥大，色黄潤，漿足飽滿。全省約蘊藏二十万斤，年产五万斤，价值四万元左右。

藜苳秧高五、六寸，叶是长条形，連梗纏繞生长，夏天开紫色花，根是土黄色，外有黑皮，互相糾纏粗細不等，有鳳头，味苦极，它的根就是藜苳（如图17）。



图17 藜苳

藜苳春秋两季生产，春季由見苗起，到夏至止（苗高約二寸）；秋季由白露起，到地冻止。大部生长在半阴半阳的山坡。用鐮刨出后，去苗，去土。


藜苳含有大量地藜苳素及揮发油、对治疗全身疼痛、关节疼痛、肌肉疼痛、四肢受风湿所致疼痛和筋絡不暢等病症有卓越效果。

## 藜 本

藜本在我省各地均产。以張家口、承德专区的赤城、蔚县、延庆、承德、青龙、平泉、兴隆等县所产質量最好，因地近古长城之外，俗称“口藜本”，其他保定、石家庄、邯郸、唐山专区也产，但量少。全省蘊藏量約一百万斤，年产

二十万斤，产值六万元左右。

藁本秧高二——三尺，梗、叶有較稀疏的細毛，夏天开白色花，五瓣，它的根就是藁本(如图18)。外皮土黑色，切



药用部分

图18 藁本

良药。主治头痛、风湿性关节痛、兼有兴奋性发汗作用；治感冒性恶寒、发烧、无汗的头痛等病症。

## 党 参

党参俗名“草中王”。我省张家口、保定、邯郸等专区都产，尤以张家口专区涿鹿、蔚县产量最多。我省蕴藏量约十五万斤，年产二万余斤，产值六万元左右。

党参秧细长，蜿蜒缠绕在别的植物身上，枝多、叶繁、长的很密，长在四——五尺。叶相对长出，绿色，夏天开花，



象豆花，秋天长豆角，青色味香，逐渐由青变成黄褐色，内有子就是党参子。到中秋以后，苗就干枯好象一縷縷的白絲。明年开春化冻以后，春风一吹党参苗又从宿根上滋长出来，这个根就是党参，长数寸到数尺不等（如图19）。党参生长在大山背坡沟漕里，人畜少到的地方，生在土坡上的独



图19 党参

根多，生在石头缝里边的杈子多。每年秋季白露前后半个月时间内刨挖最适宜，过早、过晚都不适宜，过早奶子少发空；过晚奶子也要受到损失，降低质量。挖参用镐刨或用木棍掘刺都可，出土后，去秧、去土，但找秧时留神假党参特别是和它长的相似的四叶参，有的老乡管它叫狗头党参，王不党参等等都是一路货，怎样区别它呢？四叶参的身子象个枣核，大肚子，两头尖，身上有很多疙瘩，看到这样的东西，就是假货。

经过鉴定我省张家口专区、涿鹿、蔚县沿小五台山一代，系真正“台党参”，为我省名贵药材之一，国内外大量需要，每斤价值四——五元。入药一般用野生党参做补药，治神经衰弱，功用是滋养补身、通气健胃，在治疗慢性贫血、萎黄、肠炎和初期性肺结核，胃病等均有效。同时，党参与人参不同，党参作强壮药能增加人的红血球，降低白血球的作用。（患者脾脏必需健康）。

## 沙 参

沙参系多年生草本植物，生长期二——四年，因适宜在碱性沙土地代得名沙参。我省各地名称很多，諸如白棉根、面根、白参、平乳、平婆奶等，我省各专均产，年产七万斤左右，产值十万零五千元左右。野产多为山沙参或沙参，質次，家种經唐专秦皇島栽培，質高为海沙参。野产者自生于山崗邱陵和坡洼地代。它的秧高一——二尺，叶的形多种，多为长橢圓形或是綫状針形、輪生，邊緣有鋸齒，秋天开淡色鐘形卷，果实为蒴果（如图20）。它的根細长，有橫綫，淡黃色，經



图20 沙参

加工供入药。春秋两季均能生产。春季从开冻到发芽；秋季：从立秋到封冻，为保证生产适宜多刨采2——4年以上的根。用鐮刨出后，去苗、泥土、毛須。其加工方法是：在沙参尚湿之际趁湿加工防止外皮干燥，加工时，首先分开粗細条，然后分別用开水抄一遍，抄出后，一根根去老皮，去皮时先用手将粗头部剖开一点用手摺住白心，另一隻手握紧外皮，用勁一擣，外皮就下

来了。脱皮后置席上晾晒，等晒到三成干时，用手一根根的搓、搓完再晒再搓連續三——四遍，到九成干时用麻繩捆成小把，每把半斤捆完架起再晒，晒到十成干装入木箱。若加成老

条象文編織用的竹針，需在九成干时置干平板上用搓板搓直，刮去条面糙糙部分保持条直光滑捆或根，放在缸內用硫黃熏1—2小时色白为止，晒至足成干。鮮貨五——六斤半出成品一斤視条大小而定。刨条时留心假貨，張专地区有类似沙参之牛角毛，白馬肉等植物，伪杂于沙参之間，外表元滑无抽沟凹壠粉質多支松，断面无菊花心。

沙参含有沙参皂素的化学成份，入药做祛痰剂，治慢性、支气管炎、肺炎等，同时也可用做补养剂益心血，补肺气消炎。


沙参是一种出口品种，国内外大量需用。

## 鮮 生 地

鮮生地俗名是酒壶根，酒酒根，喝酒花根。

我省各地均产，以保定专区产量最多。我省蘊藏量一百萬斤，年产五十五萬斤（鮮貨）。产值六万元左右。

鮮生地为多年生野生植物，多长在阳坡地边、地圪楞、



坝墙上、坟头上，叶上有茸毛，爬伏在地上，当中长一根莖，四——五月开小喇叭花，紫紅色，它的根就是鮮生地（即野生地）（如图21）。

每年春季由开冻起到小滿止；秋季由处暑起到地冻止。用鉄鍬挖出后，去苗，去須，去泥土。鮮生地因系时鮮东西，很容易发霉腐烂枯燥失效，最好在屋內土地上垒一磚墙，鋪一层底

— 图21 鮮生地



沙，摊一层鲜生地，使土沙经常保持潮润，保证生地长久鲜活。

鲜生地含有葡萄糖等化学成份，为补血强壮药，常用于结核性衰弱，对糖尿病、咳血、衄血、吐血、子宫出血等有很大功效，经蒸晒成熟地治贫血、神经衰弱。

过去我省生地多依靠外省输入，近一、二年因大量应用野产生地，不仅减少了外省输入，而且给农民增加了收入，每年约为十一万元左右。

## 百 合

百合俗名叫散蛋花，卷蛋花。

我省各地均产。全省蕴藏量为三十万斤，年产三万余斤，产值二千余元。以保定专区的曲阳、唐县、易县等地产量最大。

百合是野生百合花的根。它的秧高一尺多，叶象竹叶，成对的长出来，夏天在秧顶开红色花，六瓣，大而美丽，很香。它很象蒜，多瓣合成，食用也很好吃，就是百合（如图22）。

每年春秋两季均可生产。春季在长花苞以前；秋季在打籽以后。用镐刨出后，去苗秧，去毛须、泥土即可。但应注意三朵花苞



图22 百合

以下的根很小，先把小的留下，不要刨，等来年再刨，以保护幼苗。百合經洗淨泥土，分开瓣，蒸熟可食，味鮮美，入药晒干即可。

## 远 志

远志俗名是山扁头根，小鷄棵。

我省保定专区的完县、唐县、蒲城、涑水、涑源、曲阳等县和石家庄、張家口、承德专区都产，以保定专区产量最大。我省蘊藏量約为一百万斤，年产三十万斤，价值三万余元。

远志秧高一尺左右，叶窄长象針一样，夏天开浅蓝色花，它的根就是远志（如图23）。

远志多生长在沟沿、砂崗、土坡、地埂上。春秋两季生长。春季由清明起，到小暑止；秋季由立秋起到地冻止。用鐮刨出后，去苗，去土，去毛須。远志以沙土地或平原，半山区所产質量最好，适合沙土地不适合黑土。

远志是国内外大量需要的祛痰良药，系治疗各种咳嗽和痰經連續咳吐而不能咯出的咳嗽有卓效，兼治健忘，心跳，失眠，心神恍惚不安等症。是一项大量需要




图23 远志

生产的副业。

## 桔 梗

桔梗俗名是狗旦花，槲菜根。

我省各地均产。以保定、唐山、張家口专区产量最大，唐山专区迁西、蘆龙等县所产質量好。我省蘊藏量約为二百万斤，年产八十万斤，产值十六万元左右。

桔梗秧高二尺左右，叶扁圓形，边缘有锯齿，夏天开紫色五瓣重形花。根紡錘形，黃白色（如图24）。



图24 桔梗

生产季节主要是入伏后的一个月，不入伏退不下皮来（旧历小暑到处暑），俗称“伏桔梗”。用鐮刨出后，去苗、須在水中泡三——四小时用手捞出，把住根的一端用手一擰，趁湿擄去外黑皮，将根理直，晒干即可。

国内对桔梗需要量很大。入药作刺激性的祛痰药，适治支气管炎、肋膜炎、咳嗽不畅、咯痰不利、咽喉疼痛、牙床肿痛等症，有祛痰、消痛、排膿的效果。同时，还可醃制成鲜美的小咸菜，由于桔梗含有乳糖、菊糖等还能提制糖或土制糖稀。

## 紫 草

紫草俗名是酒药根。我省各地均产。以唐山、張家口、保定产量最大。全省蘊藏量約为二十万斤，年产五万斤，产



值一万余元。

紫草秧高二尺左右，叶对生，无把，象柳树叶，梗、叶粗糙，夏天稍头开白花，落叶结果，圆球形，味酸，它的根，紫皮，白肉即紫草（如图25）。将它放在水中染成红色。春秋两季都可刨采，春季由开冻起，到苗高四寸止；秋季由白露起，到地冻止。用镢刨出后，去掉秧子、蘆头、渣子及泥土。



图25 紫草

紫草中含有60%左右的紫色色素和紫草素，在医药工业中系提炼“紫草糖”药品的主要原料，同时也是治疗斑疹的良药，兼治痘疮，猩红热，丹毒，败血症，疗

癰等一切急性化脓性实症内服外擦都有卓越效果。同时又是煮酒副食等的必备原料，用它来提色，美观，鲜艳。因此，它不仅是国内大量需要的，而且每年出口量很大。

## 葛 根

葛根俗名是葛条根。我省各专山区均产，石家庄、承德专区产量最大。全省蕴量约为一百万斤，年产三十万斤，价值三万余元。

葛条是蔓生植物，爬两丈余，叶是对生，由三个小叶合成，叶的正面是翠绿色，被面是银白色，秋天开紫红色花，象小蝴蝶，结果实为绿色，是扁长形的荚果。它的根就叫葛根（如图26）。春、秋两季都能生产。用镢刨，刨出后去苗，



图26 葛根

去須。葛根中含有大量的淀粉，一能造酒、出酒14.9%左右。制醋、食用，如“葛根粉”。入药是发汗良药，治初期性的伤寒，恶寒，发热，无汗，头痛，下痢，肚疼等症。“葛花”系有解毒作用，治慢性酒中毒症。

### 紫 参（又名草何車）

紫参俗名刀剪药、破伤药。我省各地均产。以保专洩源、洩水等县为主要产区。我省蕴藏量约为二十万斤，年产五万斤，产值一万余元。

紫参，秧高二尺左右，独梗，梗靠根部有节，蔓延于地，叶为卵圆形，象柳叶，深绿色，滑泽无毛，有长柄，六、七月间开粉白色小花，排列成麦穗一样。它的根就是“参”，因根是紫色，命名“紫参”（如图27）。春、秋两季都能生产，春季



图27 紫参

由开冻到芒种止，秋季由处暑到地冻止。紫参喜欢生活在小沟阴湿地代。用鐮刨，刨出后去須、老杈子。

紫参是群众习惯用的外伤药，对局部外伤有化膿、消炎、止痛的效果，同时，它还能制酒作醋。如：用紫参造酒出酒率在14.9%左右。是粮食的代用品，治疗虫、蛇之毒有特效。

## 白毛根

白毛根俗名白毛子草根、香草等。我省各地均产，以承德、唐山、張家口、保定等专区为主要产区。全省蕴藏量約一百八十万斤，年产量八十万斤，产值八万余元。



图28 白毛根

白毛根秧高一——二尺，叶细长，秋天在秧頂长白色絨球，好象一把小毛掸子。它的根就是白毛根(如图28)。春、秋两季生产。用鐮刨出后，去苗、去土、去淨外皮。

白毛根是一种有研究价值的药用植物，它含有大量的甘露糖，葡萄糖及果糖，除入药主治淋症、小便不利、妊妇浮肿、吐血和各种出血、口渴等病症有显著效果外，同时能作“糖”，造“酒”，味甜美，对人身补益很大。



## 白头翁

白头翁俗名兔花根、老婆子花根。

我省各地均产。以承德、張家口、唐山等专区的怀柔、赤城、平谷、薊县、迁西、蘆龙等地产量最大。全省蕴藏量約为八十万斤，年产二十五万余斤，产值三万余元。

白头翁秧高一尺左右，叶自根生长出来，叶和柄都长着白毛，毛細密。春天开花，六瓣，正面为紫色，很美丽，背

面也是一层微細的白茸毛，花落后，頂上成堆状毛，白色，好象老人的白发，它的根即白头翁（如图29）。通常以三至五年的根最好。



白头翁喜欢生活在土山、沟沿地代。春秋两季都可刨采，用鐮刨出后，切断秧苗，抖淨土即可。

白头翁中含有一种叫做“白头翁素”的化学成分。

药用部分 系治疗細菌傳染性痢疾（阿米巴）的特效药，兼治月經

困难，金疮和外痔等病症。在中医經典著作——伤寒論中，对白头翁评价很高，称它为治疗热性痢疾的要药。

## 薤白

薤白俗名小蒜。

我省各地均产。以保定、天津、石家庄专区的涞水、涞

源、宝坻、安次、平山等地为主要产区。我省約蘊藏七十余万斤，年产二十余万斤，产值三万二千余元。



图30 薤白

薤白秧高一尺左右，梗、叶细长，三角形，深绿色，梗、叶都有蒜叶，秋天，秧顶开紫色、六瓣小花，根象小蒜，就是薤白（如图30）。

薤白季节性很强，大约在清明节后一个月左右的期间进行刨采，用镐刨出后，去苗、去泥土、去须根就行。

薤白含有糖类等化学成分，是和缓性祛痰药，并用宽脑作用。是治疗胸痹气喘、咳嗽、胁痛、多痰和大便稀少等症的良药。

## 狼 毒

狼毒，俗名小鸡鸡花。

我省各地均产。以张家口、承德、保定专区产量最大。全省蕴藏量约为一千万斤，年产三百余万斤，产值三十余万元。

狼毒是一种有毒的野生植物，秧高一尺左右，叶和梗生有白毛，其根红黄色，即狼毒。

狼毒在每年春秋两季都可生产，用镐刨出后，去秧，去毛须子即可。

狼毒在医药上有很大价值，不仅是治疗淋巴腺结合的特

效藥，而且是具有強烈毒性的杀虫剂。对扑灭四害、消灭虫害有很大貢獻。

涿鹿县医院用狼毒与紅枣合剂配制成狼毒枣、狼毒膏，用来治疗淋巴腺結核很有效，据統計不論久患或新得全愈率在80%左右，效果极显著。經总结有四大好处，一点注意。四大好处是：①制作簡便（附法）。②价格低廉（仅花7—8角錢可配一斤枣）。③服用省事（日服二次，每次吃五枚狼毒枣）。④效果显著。一点注意就是不可多服。

狼毒枣、狼毒膏是怎样制作的呢？制法簡單，人人能动手，家家会制作。首先从中药店买回三斤狼毒，从副食店买回无虫的大紅枣四斤，就是配成一剂或一料的原料。制时，先将狼毒放入清水鍋內，加水以（不要太多）不干鍋为限，一般要4—5斤水（浸透狼毒），加大火，水燒开后，將紅枣

用清水洗淨，放在籠屉上蒸，約一小時左右。用鍋內的狼毒水澆紅枣（要澆透），再加火蒸一小時左右，枣由紅变黑，味苦，即制成了狼毒枣。將鍋內湯中狼毒撈出后，剩下的狼毒水，再加火熬二小時左右，成胶状液体，即制成狼毒膏。食用时，經医生檢查服用，成人日服两次，飯后服用（約距吃飯一小時左右），每次吃



图31 狼毒

枣五枚。膏用来外敷于患处，系驅虫、杀菌之良藥。由于毒性大戒內服（如图31）。



## 山 豆 根

山豆根俗名是山菀豆根子、苦豆根子。

我省各地山区均产。以邯鄲、保定、張家口、承德等专区的沙河，內丘，易县、涞水、涞源、龙关、赤城、青龙等地为主要产区。全省蘊藏量約为一百五十万斤，年产五十万斤，产值六万余元。




图32 山豆根

山豆根秧很象我們食用的菀豆秧，梗細柔軟，夏天，出麦形穗，开蝶形花，根就是山豆根（如图32）。

山豆根喜欢生在山坡土質松散地带，春、秋两季都能刨采。用鎬刨出后，去掉豆秧苗，和根上的毛須。

山豆根味发苦，系清火，解毒，消炎的良藥。主治咽喉肿痛，喉头发炎，咳嗽气喘等

症有显著效果，外用可浸入醋中，在患处用根涂抹，治疥癬等皮肤病。

## 苦 参

苦参俗名是野槐根、山槐根、水槐根、苦骨等。

我省各地均产，以保定、承德、張家口专区的安国、易县、涞水、完县、圍場、兴隆、涿鹿等县为主要产区。我省蘊藏量約有二百余万斤，产值八万余元。

苦参秧高二尺左右，小叶椭圆形，很象槐树叶，夏天在



图33 苦参

秧的頂上开花，白色，花象小蝴蝶，七、八月結豆角，（好似毛豆角），它的根就是苦参（如图33）。

苦参在春、秋两季均可刨采，用鐮刨出后，去秧苗、去蘆头、去毛須和空心，晒干即可。

苦参是解毒、清热、健胃、杀虫药。治疗热性肚疼、紅色痢疾、腸出血、腸瘍、胃热、口干、舌燥等症。同时对农作物寄生虫有巨大驅除效果，是杀虫妙药。

## 貫 众

貫众，俗名是野鷄膀子、毛貫仲（如图34）。

我省各地均产，以保定、張家口、石家庄等专区的徐水、淶源、涿鹿、宣化、灵寿、井陘等地是主要产区。全省蘊藏量約为八十万斤，年产五十万斤，产值四万余元。

貫众，秧高一尺左右，叶好象野鷄翎，有鋸齿，秧从根直接生长出来，同时有



图34 貫众

几棵秧出自一根，所以取名貫众，药用它的根。

每年春季生产，由开冻起，到芒种止。喜欢在河边淤洼地带生长。用鐮刨出后，去苗去土。刨采时，要注意根部没有癭形疮疽的不要刨。貫众系驅虫、止血、解毒良药。用它治疗各种蠊虫，子宫出血，妇女血崩，虫积肚疼等症有显著效果。同时，用于牲畜，驅治蛔虫亦有同样效果。

## 漏 蘆

漏蘆，俗名是和尙头花根、牛饅头根、老牛疙瘩根。

我省各地山区均产。以唐山、承德、石家庄、張家口等专区的蔚县、平谷、迁西、密云、建屏、阳原、蔚县等地为主要产区。全省蘊藏量約一百五十万斤，年产五十余万斤，产值五万余元。



图35 漏蘆

漏蘆秧，高二尺左右，叶很厚，对生，背面稍有白色，秋天秧頂开藍紫色花，花象一朵絨球，花落后結籽，秋后，秧子干枯变成黑色，它的根就是漏蘆（如图35）。春、秋两季都可刨采，春季由清明起到夏至时止，秋季，由处暑到地冻止，以秋季所产的产量好，肥大。多生在山的阳坡。用鐮刨，刨出后去苗，去杈子，去掉泥土，晒干即可。漏蘆为通乳管的良药，并有清热、消



毒、去肿的作用。主治乳汁不通，乳头肿痛，发背，恶疮等症。

## 地 榆

地榆俗名是山紅枣根。

我省各地山区均产。以唐山、張家口、保定、邯鄲等四专区的平谷、薊县、安国、龙关、赤城等地为主要产区。蘊藏量約为三百余万斤，年产一百五十余万斤，产值十二万余元。

地榆秧高二——三尺，长卵圆形小叶，有锯齿，秋季在秧頂尖处开紫紅花，形状好象小紅枣，它的根就是地榆（如图36）。



地榆春秋二季都可生产，用鐮刨出后，去掉根上的毛須子、杈子、泥土。

地榆的气味稍微有点苦，我省所产質量較高，它对局部小出血、有止血之效，性緩和，收斂作用很显著。为止血妙剂，适用各种出血，如：吐血、咯血、大便出血、紅色痢疾及女子赤白帶下、月經过多和湿疹，小出血。其

图36 地榆

中尤以治大便出血有卓效。

此外，对治灼伤、烫伤也有良好效果。如将地榆用小火焙干，研成细末，用香油（芝麻油）调成浆糊状，要稀一点，涂在烫、灼伤处，若伤处皮肤因烫成泡状，可用消毒针轻轻挑破，以纱布揩干腐水，再涂上此药。上药后不要用东西包扎，也不要用水擦洗，否则会影影响疾病痊愈，或产生不能避免的伤疤。据得益的患者总结，此方有四大好处：①涂上当即止疼；②防止腐烂扩大；③好的快；④药价便宜，使用方便。

## 蘆 根

蘆根俗名是葦子根。

我省各地均产。以保定、天津、石家庄等专区产量最大。全省约蕴藏二百万斤，年产四十余万斤，产值四万余元。



图37 蘆根

蘆根系蘆葦的根，系多年生植物。家蘆葦产于葦塘、坑洼地；山葦子产于山沟、地边、地埂上，家、山葦子都喜欢水，山蘆葦较为耐旱。春天由宿根生苗，高达一丈左右，茎中空，叶对生，好象竹子叶，秋后在稍头长白色花穗，经秋风一吹，代有小籽的绒毛散布各地，根丛生，横生于地下，有节、白色、柔润，即蘆根（如图37）。山蘆葦根质量

較好。

蘆根在春秋都可挖，用鉄鉋挖出后，洗去泥土、掰掉根須，晒干即为成品。

蘆根內含有天門冬碱，蛋白質、糖、脂肪等成分，系清涼、解熱、生津的良藥。对急性熱病、麻疹、發燒、煩悶不安、口舌干燥、嘔吐不止，大便稀少及斑疹未透等症有良好效果。同时蘆根还是誤食魚、蟹中毒或河豚中毒的解毒藥。并在工业上用以作造酒原料。

蘆根在我国民間习惯用它治麻疹，方法也很簡單，即：选用大而鮮的砍成小节，煎成湯，喝时不受数量、時間局限，可自由飲用，小孩并可加少量白糖，也不受病况局限，凡患麻疹者不論是剛发病，还是潜伏期，都可飲用。

## 丹 参

丹参俗名叫大紅炮。



图38 丹参

在我省主要产地是保定专区的阜平、曲阳、唐县、完县、滿城、涞水、易县等地，承德、張家口专区也产一部份。我省蘊藏量約为一百余万斤，年产五十万斤，产值十万余元。

丹参多生长在山沟、山坡和道旁，秧高一尺左右，叶对生，形状好象人的心脏，夏天开紫色或白色花，好象嘴唇一样，根的外皮为紅色，里面呈紫褐色，味甜（如图38）。



丹参春秋两季均可刨采，春季由开冻起，到苗高四——五寸止；秋季由处暑起，到地冻止。用鐮刨出后，去苗，去淨泥土，晒干即可。

丹参是强状性妇科良药，主治子宫出血，月經不調、肚疼、关节痛、赤痢、腸炎等病症，同时，还可以作造酒原料。

## 枣 仁

枣仁俗名“酸枣仁”，是一种貴重药材。我省邢专、保专、邯专、唐专都产，以邢专的沙河、内丘、临城、邢台四县产的最多、質量最好。全省蕴藏量約二百万斤，年产量約六十万斤，价值一百五十多万元。

酸枣树是一种落叶灌木，叶有把，互生（交叉生长），为卵圆形，边缘有锯齿，夏天开浅綠黄色小花，五瓣，花的形状好象一把小伞，結果实为圓形，熟后为紅色，肉很酸，

能吃，其核內之仁就是“酸枣仁”（如图39）。



图39 枣仁

每年酸枣成熟以后，用竹杆打下来，或等它熟透落地，用笤帚扫起，把青枣拣出，等到立冬以后，找一个气候干燥的日子，趁日出以前或日落以后，将冻干的酸枣用石碾碾一遍，碾完鋪平讓风吹干吹脆，篩去枣面，再碾第二遍，第三遍……直到把核上的枣面碾淨，然后

将核洗净晒干，再碾开枣核，筛出或旋出枣仁。

酸枣仁有镇静催眠的作用，对治疗失眠、烦躁、心悸亢进及盗汗等症有显著的疗效，并可作为健胃滋养剂。加工枣仁时筛出的枣肉用途很广，可以作糕点、作醋，拌上谷糠又是喂猪的好饲料。酸枣仁也是国家的出口物资，可以换取外汇，但因近年来中医中药事业发展，国内用量大、产量小，连年产不足销，更不能满足出口需要。我省各地山野、村边都遍生酸枣树，但酸枣熟红以后，大部被小孩摘食，造成很大损失。

## 郁李仁

郁李仁俗名“欧李仁”，是一种落叶灌木。我省张专、保专、唐专各县均产，以张专崇礼、赤城两县产量较大。全省蕴藏量约三万斤，年产量约二万斤，价值三万多元。



图40 郁李仁

这种灌木高约一、二尺，叶卵圆而长，边缘有锯齿，春天开淡红色小花，结果为圆形，其核之仁就是郁李仁(如图40)。

每年秋天果熟了以后就可以采摘，采摘方法可以用杆往下打，也可以等果熟透自己掉下来，用手拣或用笤帚扫，肉可以吃，留下核，把核晒干砸开，或用杏仁机缩小口径轧开，将仁拣出。

郁李仁藥用很广泛，疗效显著，对慢性便秘有緩下作用，对肾脏有刺激作用，可促进利尿机能，治习惯性便秘、水肿、腹水、脚气等症，孕妇慎用。近年来，因中医中药事业发展，藥用量很大，但因系野生产量有限，呈供不应求情况。

## 杏 仁

杏仁为杏树的种子。分为甜杏仁与苦杏仁两种。合計年产量約五百余万斤，价值二百余万元，其中甜杏仁价值較貴，每斤平均約六至八角，苦杏仁每斤約四至六角。全省各地均产，但以保专的涑水等县产量較大。

每年六、七月杏熟以后，是砸杏仁的季节。数量少，可以用繩做圈，将杏核放在圈內用木棒或斧头砸，可以保证仁整不碎。数量多，可用杏核机軋开，再拣仁（如图41）。

甜杏仁是一种具有滋潤性的藥物，內服可以滑潤腸道，有緩下作用，剥皮以后，用作敷科，有保护性作用。可以治疗經常性的干咳及肺結核咳嗽。除藥用外，甜杏仁可以制作糕点、小菜、杏仁茶、杏仁油、杏仁酪、杏仁霜等，用途很广泛。

苦杏仁可以鎮靜呼吸中樞，使呼吸运动安靜，并



图41 杏仁



有鎮痙之效。能治療慢性氣管炎、支氣管炎、支氣管擴張及由於支氣管痙攣所引起的咳嗽等症。苦杏仁可以製作杏仁水及提取杏仁油。狗咬傷瘡可用杏仁和紅糖杵爛塗之（民間單方）。但苦杏仁不宜大量食用（苦杏仁中含有苦杏仁素和苦杏仁酶加水分解後，產生一種痙攣酸，系放射性有毒氣體，不宜在處方中多量食用）。

## 山 桃 仁

山桃為野生灌木，就是沒有經過接種的桃樹，葉互生（交叉生長），長橢圓形，頭部很尖，邊緣有很細的鋸齒，春天開淺紅色或白色花，結果實很小，肉很薄，不能吃，其核之仁就是“山桃仁”（如圖42）。



我省保專的淶水、淶源、張專的延庆等縣產量較多，年產量約七、八萬斤，價值三萬多元。

山桃仁分為兩種：一種叫“大扁”，形狀為扁平卵圓形；一種叫“滾子”，形狀為卵圓形。每年果熟落地後，用笞帚掃起，去掉桃肉，將核砸開，或用軋核機壓開，將仁煉出。

山桃仁為鎮咳藥，用於喘息、咳嗽、呼吸困難、身體浮腫等症。其油榨出，可用於工業原料。並且是國家的出口物資，可以換取外匯。

圖42 山桃仁

## 薏 苡

薏苡又名“薏米”，俗名“草珠子”。是一种当年生草本植物所結的果实。我省保专安国县每年均种植一定亩数。年产量約三万多斤，价值一万余元。

它的秧高四尺左右，叶是綫形或針形，夏秋之間在叶柄的地方开花，白色，形状如穗，所結的果实为椭圆形，很光亮，淺褐色，掰开里面为白色，味甜，就是“薏苡”（如图43）。



图43 薏苡

每年白露到秋分之間，是采集薏苡的季节，这时果实已經成熟，呈紫黑色。根据安国县的习惯，大多与大蒜間作。采集时；先割下地上的秧子，放在广场晒干，然而用手倒提秧子，讓穗头朝下，用木棒打穗，果实即落；将果实晒至十成干，用碾子碾开外壳，用扇車吹去壳皮，碾三次，吹三次，到籽粒色白光亮即可。

薏苡含有大量的醣类、淀粉和蛋白質。是一种最富有营养，容易消化的谷类，蛋白質含量之多，为其它谷类所罕有。用作滋养消化药，可治消化力薄弱，胃中积水，时时下利清谷等；用作鎮咳利尿药，可治腎脏炎、肺萎縮、肺膿瘍的咳血膿血等；用作鎮痛鎮痙药，可治筋肉运动障碍及脚气、疝气等症。

## 五味子

五味子分南北两种：南产色紅，叫南五味子；北产色黑紅，叫北五味子，藥用滋补以北产的好。我省所产的即为北五味子，承德专区、張家口专区均产，以承德专区的兴隆、灤平、丰宁等县产量較多。全省蘊藏量約三万余斤，年产量約一万多斤，价值四千多元。

五味子是一种蔓性常綠灌木，它的秧好象葡萄秧，叶有很长的把，互生（交叉生长），卵圓形，有細鋸齿，开白色小花，有香味，花落以后，結成串的圓球形果实，里面含有浆水，成熟以后变成黑紅色，表面有皺紋，果內含有三、四粒籽，因为含有酸、甜、苦、辣、咸五种味道，所以起名叫“五味子”（如图44）。大部生长在山林、沟沿等地带。

每年霜降以后，是采集五味子的季节。采集时，用手摘，但必須一嘟嚕一嘟嚕的摘，带点小枝，不然浆水就要流失。摘回去以后，用开水燙一下，放在干淨的地上晒，席上晒的色气不好。晒到四、五成干，摘去小枝，一再晒，晒到用手攢一把，松手后能自动散开不沾手就行了，不要晒的过干。



图44 五味子

五味子的藥理作用是



兴奋中枢神经系统，增加心脏和血管张力，调节血液循环，加强呼吸，增高血压，促进反射兴奋性。它的疗效很广泛：作为滋补强壮药，可治神经衰弱机能衰退及病后衰弱；作为镇咳祛痰药，可治久咳、气喘及肺结核症；作为收敛药，可治自汗、盗汗、遗精、小便频数，小儿遗尿以及肠结核患者的五更泻症；除此以外可治赤痢及失眠。

## 枸 杞 子

枸杞子是一种落叶灌木所结的果实，是一种贵重药材。主要产在天津地区的大城、静海两县，张专、邯专也有少量出产。全省蕴藏量约十五万斤，年产量约五万斤，价值十五万多元。

它的秧高约二尺左右，小枝长的很密，枝上有刺，叶是长扁圆形，夏天从叶把的地方开花，浅紫色，秋天结果，果实熟了以后为鲜红色，是一种扁圆形的浆果，就是“枸杞子”（如图45）。



每年五月间是采摘枸杞子的季节，随红随摘，摘下后放在席上晾晒，中午阳光太烈，不能晒，可移至通风的地方晾干，在晾晒过程中，不要用手翻弄，以免变色发黑，可用木杆拨动，到七——八成干即可。

枸杞子为强壮药，治疗消渴病，糖尿病及营养不良性的眼目昏花。

图45 枸杞子

## 莨 菪 子

莨菪子又名“天仙子”，俗名“鬼翻額子、要命桃子”，是一种野生的宿根草所結之籽。我省各地均产，以張专坝上各县产量較多。全省蘊藏量約四万斤，年产量約二万斤，价值一万二千多元。

它的秧高一——二尺，叶互生（交叉生长），长椭圆形，很柔軟，初夏开白色带斑点的小花，花的形壮象小鈴鐘，結的果实內藏有許多茶褐色的种籽，就是“莨菪子”（如图46）。它的根、莖、叶，都是剧毒药。誤吃了莨菪子，就要

中毒狂乱奔走，本草綱目上也說：“其子服之，令人狂浪放蕩”。

这种植物生长在粪坑旁、猪圈旁、及其它潮湿肮脏等土壤肥沃的地方。



图46 莨菪子（天仙子）

每年秋季果实成熟以后就可摘果，摘下后晒干用木棒打开，用簸箕簸淨杂质即可。由于莨菪是一种剧毒药，采集时如手上沾上了白色絨毛，不可揉眼，以免中毒，用手摸籽以后，也不能揉眼，以免瞳孔散大，吃飯前要注意洗手。

莨菪子含有莨菪碱、阿托品等成分，是一种鎮痛及鎮痙药，治疗神經痛、胃痛、齿痛、支气管痙攣性喘息等症，并

可作为安眠药，外用治腺肿、瘰癧等症。可以制成莨菪酊、莨菪浸膏、莨菪流浸膏等单方。

## 王不留行

王不留行俗名“王不留”，是一种当年生的草本植物之籽。我省邢专、張专、保专、石专均产，以邢专的邢台、沙河、武安、涉县产量较大。全省蕴藏量约一百万余斤，年产量约七十万斤，价值七万余元。

它的秧高一、二尺，叶为浅绿色，对生（两叶并生）夏天开花，浅红色，五瓣；所结之果实内有籽，即“王不留行”（如图47）。

药用部分




图47 王不留行

每年芒种前后，是采王不留的季节，果实成熟以后用镰刀割下来，然后放在广场上晒干，用木棒打或用扭轴轧，将籽轧出后，用扇车或用簸箕去净杂质即可。

王不留药用有限，外用可以止血镇痛，内服可以催乳，但因它含有大量淀粉，可以制糖稀、制醋及其它食品，目前，各地食品加工厂为了节约

粮食，纷纷以王不留作为加工原料，这种药材就由滞销一跃而为供不应求的品种。

## 牛蒡子

牛蒡子又叫“大力子”，俗名“粘耗子蛋”。我省張



专、承专、保专、唐专等地都产，以張专的崇礼、赤城、龙关三县产量較多，全省蘊藏量約十萬斤，年产量約三萬斤，价值一万五千多元。

它的秧高三尺左右，叶很大，好象人的心脏，叶的背面生有一层白毛，开淡紫色的花，花落以后結果，果上长很多刺，一个果內有几十个籽，就是“牛蒡子”（如图48）。大

部生长在沟塘等潮湿地带。

每年秋天果熟了以后，用剪刀或手将果摘下来，然后鋪在場上晒干，用木杆将果打开或用碌磙軋开，再用簸箕簸出皮和杂质或用搗車吹淨即可。果不熟不要摘取，一般凡是嘴上的刺干了，裂嘴了，用手能揪下来就是熟了。

牛蒡子含有大量的纖維質、蛋白質、脂肪、醣类、单宁酸等，疗效非常广泛。

牛蒡子配醣体，就有发汗、



图48 牛蒡子

利尿、清热、解毒及消炎、鎮痛等作用，可用于疮瘍、肿胀，促进其化膿，并对痧疹有催促发散的作用。用作变質药可治疗疮毒、肿瘍、浮肿及咽喉疼痛肿胀，并治淋巴腺結核解虫毒、蛇毒、能化膿。用作解热药可治伤风、痧疹、白喉、丹毒、猩紅热、耳下腺炎等发热。除此以外，牛蒡子还可以用作緩下药，利尿药及驅风药。牛蒡根还可以治疗脚气及疥癬。

## 蒼 耳 子

蒼耳子是一种宝贵的油料，同时也是一种用处很大的药材。

蒼耳子遍生于我省各地，年产几千万斤，可挖潜力极大。

蒼耳子系野生的草本植物。莖高、枝大，最高可达六市尺，根部紫色，莖綠色，代有較少的紫色斑点，叶边缘有不規則的鋸齒，叶上有网状脉，三条主脉尤为明显，春末夏初，生头状花序，多长在莖頂或叶腋处。花单性同株，雄花序球状，雌花序綠色卵形。它的子实丰硕，外有灰褐色带有堅硬針刺的包皮，卵形，长一至一点五厘米，寬約零点四至零点六厘米，打开包皮內藏有黄豆粒大小的蒼耳子两顆，外表为黑棕色发亮（如图49）。



图49 蒼耳子

蒼耳子經化学分析，含有1.2%蒼耳精（即蒼耳甙）39%脂肪，3.3%树脂和多量維生素內与生物碱、色素等。由于它含有大量脂肪，适用做油料，出油率平均在16—18%左右（黄豆出油率为13%）是一种棕黄色的干性油，与我国特产桐油質量相似。用它不仅可以做油漆、油墨、肥皂，抹水車，潤滑机器等大量应用，而且可以用它点灯和食用。榨出

油的蒼耳子餅还可喂牲口或作肥料。

蒼耳子入藥为发汗藥同时也有鎮痛、利尿等作用，可治疗肌肉神經麻痹、关节疼痛等症。

## 小 茴 香

小茴香是一种农田作物，各地菜园都有种植。我省各地均产，以承专、張专产量較多。年产量約一万斤，价值五千元。

小茴香为一年生草本植物，秧高二尺左右，叶細如絲，夏天开黄色小花，五瓣、形状略似一把小伞，秋天結果，很香，就是“小茴香”（如图50）。

每年秋天，小茴香成熟之后可以連秧割下晒干，然后将籽抖落扫起。

小茴香有促进消化的机能，能够增加胃液的分泌，排除腸内气体，并有祛痰催乳的作用。用作芳香性健胃藥，可治神經衰弱性的消化不良症；用作驅風藥，可治鼓腸腹瀉症；除此以外，还可治疗疝痛及作为祛痰藥、驅虫藥，及用于利尿、催乳剂。家庭用小茴香当作調味料。

藥用部分



图50 小茴香

## 萊 菔 子

萊菔子就是“大蘿卜籽”，蘿卜是一种当年生的蔬菜，我省各地菜园都有种植，以天津承专的黃驊、靜海、團場等县产





图51 莱菔子

量較大。全省年產萊菔子約二十萬斤，價值七萬餘元。

蘿卜葉為長圓形，上寬下窄，互生（交叉生長）邊緣有鋸齒，開紅白色花，結長圓形的角，角內的籽就是“萊菔子”（如图51）。一般藥用以大紅蘿卜籽最好，水蘿卜籽較次。

萊菔子為消食祛痰劑。適用於消化不良、痰濁壅滯之嘔吐，及胸悶、咳嗽、氣喘等症。

## 牽牛子

牽牛子又名“黑白丑”，是一種當年生蔓性草本植物的種籽。我省各地均產，以石專的井陘、建平縣及保專的安國縣產量較多。全省年產量約三萬餘斤，價值二萬餘元。

它的秧就是牽牛花，又叫喇叭花，各地花園、庭院都有種植，葉互生（交叉生長），裂成三瓣，葉的形狀好像人的心臟，莖和葉上長一層白茸毛，開的花象小喇叭，結的籽就是“牽牛子”。開藍花，結黑籽，叫做“黑丑”。開白花或粉花，結白籽，叫作白丑。

每年籽成熟以後就可以採集，約在秋季九月前後，採集時用手摘或用剪子剪，然後用木棒打開，簸淨即可。黑白丑應分開，別混合。

牽牛子有劇烈的瀉下作用和驅蟲功效。作為峻下利尿

剂，治疗水肿便秘而（体力结实的人）；作为驱虫剂，可治寄生虫病；外用可涂雀斑。

## 車 前 子

車前子俗名“車轆轤菜”“碾碾轉”“猪耳朵”，是一种多年野生的草本植物所結之籽。全省各地均产，以保专、

天津专区产量較多。全省蘊藏量約五十余万斤，年产量約万余斤，价值四千余元。

它的秧高一尺左右，叶从根部生起，有很长的把，叶边无鋸齿，长卵形，有很显著的几道脉筋，夏天开花，淺紫色，形状如穗，里面含有种籽，这就是“車前子”（如图52）。一般生长在道边和潮湿的地带。

每年立秋前后采籽、用手捋下以后，用簸箕簸净即可。

車前子有鎮咳祛痰作用。用作利尿，可治小便不利、热痢不止及尿血等；用于鎮咳，对百日咳、支气管炎有效。



图52 車前子

## 蛇 床 子

蛇床子是具有抗生作用的中药。俗称土蒴藋卜子、蛇米、蛇粟等。

我省各地均产，尤以天津郊区产者最佳。

蛇床子系多年生草本植物。莖初臥地似蛇形，后昂起，



图53 蛇床子

高一市尺左右，叶似羽毛，分裂成数片，有锯齿边，夏天在茎顶开白色五瓣小花（有时开于腋下）。椭圆形，气味似松节油稍有苛辣，药用其果实（如图53）。

秋季，用手将子摘下，晒干后，揉开用簸箕簸净即可。

蛇床子是一种黄绿色草子，它含有挥发油，脂肪酸，甘油等成分。用蛇床子结晶，硼酸，乳糖，滑石粉等制成阴道片剂，蛇床水冲

洗，治疗阴道滴虫，据研究证实医疗痊愈的患者占百分之八十三点三。此外在治疗皮肤癣方面也有很大效果。

## 葶 藶 子

葶藶子俗名（如图54）。“拉拉”“麻麻”，是一种当年野生的草本植物所结籽。我省各地均产，以石专、邯专产量较多。全省蕴藏量约二十多万斤，年产量约五万余斤，价值二万余元。

它的秧高六、七寸，叶窄碎，有小锯齿，夏天开白色小花，花后结籽，好象车前子，杏黄色，即“葶



图54 葶藶子



麤子”。大多生长在墙根、道旁、脏污的地方。

每年秋季采籽，用手将籽捋下，晒干簸淨即可。

葶藶子为利水、祛痰药。适用于咳嗽、气喘、痰飲、痰多壅滯、湿性肋膜炎，胸腔积水，及小便不利、面目浮肿等症，以利用的目的收治疗之效。

## 柏 子 仁

柏子仁就是柏树的籽仁。我省各地均产，以保专产量較多。全省蘊藏量約十三万斤，年产量約五万余斤，价值二万多元。

柏树各地都有，故不再介紹它的形状。

每年秋天柏树籽成熟以后就可以采集，采集方法是用木杆将籽打下收起，再用木棒将里面的小黑籽打出来，然后用磨串去黑皮，将黑皮簸淨即可。

柏子仁药用范围很广，可作为歛血、上汗、滑腸、潤肺、安神、鎮惊、健膝、壮腰之用，并可以用作鎮咳祛痰药、滋养强壮药、及滑潤性泻药。

如：小兒夜啼、惊啼、用柏子仁搗为細面，成粉末，最好过罗，一至二周岁者服二分，三至四周岁者服五分，粥、湯調下，一天三、四次，数日內即可痊愈。

## 菟 絲 子

菟絲子俗名“菟絲兒”，是一种当年生的寄生草所結之籽，自生于山野。我省各地均产，以天津专区的滄县产量較大。全省蘊藏量約一百五十斤，年产量約三十万斤，价值九万元。

它的秧一般均纏繞在豆秧上，雨水越大，黃絲越旺，沒




图55 菟絲子

有叶，夏天开黄白色小花，所結之籽就是“菟絲子”（如图55）。

每年秋季，籽成熟以后，用手捋籽，积多了以后，用簸箕簸淨即可。

菟絲子是一种强精和强壮药，治疗阴萎、遺精、遺尿等症。特別对小便过多，遺精早泄、腰痠、膝痛等病有特效。

## 鳳 眼 草

鳳眼草就是“椿树籽”我省各地均产，产区不分主次。全省蘊藏量約三十余万斤，年产量約十万斤，价值三万余元。

每年秋季是采摘鳳眼草的季节，采摘时，用木杆捆上硬鉄絲圈，将鳳眼草套住一擰，即落在地上，然而收起晒干即可（如图56）。

鳳眼草的用途，可用于明目、活血。




图56 鳳眼草

## 款冬花

款冬花俗名“冬花”，是一种市場上极缺的药材，价值較貴。主要产在張专怀安、宣化、蔚县三县。蘊藏量約三千斤，年产量仅二千斤，价值二千余元。

冬花为多年生草本植物的花蕾，叶的形状好象人的心脏，有锯齿边，从根部直接长出来，每年秋末冬初的时候，在根部生花蕾，花蕾出土以后就开花（如图57）。生长在暖泉沟旁或是背风向阳較暖的地方。



图57 款冬花

采冬花的季节，大多在寒露前后，采摘时，不能等到花蕾露出地面，发现冬花的叶子，就可以将土刨开，用手摘或用剪子剪，如果刨出秧子，摘下花蕾后要仍旧埋好，明年还能生长。采下花蕾以后，去掉泥土（不要洗），

放在席上晾晒（如能烘干更好），到三成干以前不能用手摸，也不要用手拨弄，以免发黑发毛或碰花瓣，翻个时，可以抖动一下席子。到十成干就可以收起。

款冬花的功能主要是对呼吸道的分泌有增加的作用，是一种镇咳祛痰药，治疗支气管扩张、慢性气管炎、肺炎及肋膜炎所引起的咳嗽。冬花叶是一种解毒药，治疗河豚中毒很有效。目前，我省产冬花的地区很少，应大力进行培养，



变野生为家种，以扭轉市場上的奇缺状态。

## 玫 瑰 花

玫瑰花俗名“刺玫花”，是一种野生或栽种的落叶小灌木所結之花蕾。主要产在我省張专赤城、阳原等县。年产量約一万斤，价值一万余元。

这种小灌木高約三、四尺，枝上密生小刺，叶为复叶，好象羽毛一样，橢圓形，叶上生有毛茸，夏天开花，单瓣，深紅色，很香。未开的花蕾就是藥用的“玫瑰花”。

采集玫瑰花的季节在夏季花苞未放时。用手摘下后，放在通风的地方阴干即可。

玫瑰花有收斂作用，并可制止胃腸发酵，应用于急慢性腸炎，主治腸炎下痢，妇人月經过多，赤白带下，及吐血、咳血、衄血等症。由于玫瑰花气味芳香，又可作为糖果等食品の調味品。食品店售卖的“桂花”就是用玫瑰花作的。

## 馬 兜 鈴

馬兜鈴俗名“山香瓜”“臭鈴鐺”，也是市場上很缺少的藥材，价值較貴。我省各地均产，但以保专的易县、涑水、涑源、完县、唐县产量較多。全省蘊藏量約十万斤，年产量約二万五千斤，价值約三万元。

馬兜鈴是一种野生的宿根所結之果，它的秧是爬秧蔓生，纏繞在别的植物上，叶是三角形，又有点象心脏形，夏天开花，淺紫色，形状象圓筒子，結的果是卵圓形里面有籽、褐色，叶落以后，果实垂挂在秧上，好象馬脖子下挂的小鈴鐺，所以起名叫“馬兜鈴”（如图58）。

采摘馬兜鈴的季节在秋季兜鈴成熟以后，未裂嘴以前。



图58 馬兜鈴

是一种很缺少的药材，各地应注意保护，以增加副业收入并支持人民用药。

馬兜鈴是一种有效的镇咳祛痰药，治疗咳嗽、喘息、咯血、失音等症，外用可治痔疮出血、肛门肿痛及作为虫蛇咬伤的解毒药。将馬兜鈴放入瓶内烧烟熏肛门，可治痔瘻肿痛。

### 瓜 萼（附瓜萼仁）

瓜萼是一种多年生的攀缘植物所结的果实。我省主要产区为石专的井陘、平山等县，邯专、保专也有一定产量，但质量不如石专所产的好。全省年产量约三万余斤，价值七万余元。

瓜萼的叶，很平滑光亮，夏天在叶腋开白色花，所结的果实为圆形，杏黄色，果实内有种子。果实为“瓜萼”，种

摘的时候带点小把，摘下以后立刻把小把捻一下，以免干了以后裂碎，最好在兜铃头上发黄白色未裂嘴的时候摘，一捏就响，早摘晚摘都不适宜，早摘不熟，干后就变成了黑色，晚摘就要变成苍白色，并容易裂碎，正当的色气是黄绿色。摘下以后，好天就用太阳晒，翻个时用棍慢翻，连雨天在屋里烘干，不要湿着存放。目前，各地大都把馬兜鈴的秧子压了绿肥，损失了很多兜铃，由于兜铃价值较贵，又是一种

子为“瓜蒌仁”。

每年霜降前后，是采摘瓜蒌的季节，这时瓜皮已经变黄成熟，如果霜降时仍有一部分瓜蒌尚未成熟，也要一起摘下。为了便于保管，可以连秧割下来，将秧编成辫子，挂在屋檐下或屋内通风的地方，经常倒翻，以免霉烂变质，到六、七成干即可。

瓜蒌为和缓性祛痰药，兼有清凉作用。适用于胸膜炎、肋膜炎、胸痹、气塞、短气、胃痛、胁痛、痰多不利、口渴、便秘等症。瓜蒌仁为祛痰药。

## 蒲 黄

蒲黄是一种生长在池沼的宿根草的花粉，黄褐色。我省主要产区为邯郸的磁县，保专、天津也有少量出产。全省蕴藏量约四万斤，年产量约二万斤，价值一万余元。

蒲黄的叶丛生，长四、五尺，有平行脉，厚而柔软，夏天在顶上开花，花为穗状（如图59）。

采集蒲黄的季节在每年夏至到小暑之间，大约1至2星期，季节性较强，早采不熟，晚采花粉容易被风吹走。采集时，腰间挂一个布袋，将花穗弯伸入布袋，轻轻抖动，花粉就落入布袋，最后将花粉




图59 蒲黄

倒出过筛，去净杂质，晒干即可。

蒲黄有止血和收缩子宫肌及消炎利尿的作用，治疗吐



血、衄血、尿血、腸出血、子宮出血等，并治跌打損傷、疮癰腫瘍、婦女白帶等症，除此以外，还可以用作止血及消炎利尿。禁用于妊婦。

## 槐花 槐米 槐角

三槐（花、角、米）是人人皆知槐樹上長的，槐樹在我省來說几乎到处可見，俗語說“門前拴馬槐”或“槐蔭”，老年人為取吉利总在門前栽几棵槐樹，因此，自古以來槐樹在我省得到大量繁殖的機會，日偽和國民黨罪惡統治時期，多被砍掉，解放後，由于大量造林，槐樹也得到空前未有的大發展，因此，槐花、槐角、槐米也就多起來，但人們還不太熟悉它的用途，收集的還不太多。希望廣大社員在季節內要重視它，把它一點不剩的收集起來。

三槐在我省蘊藏量約有一千五百余萬斤，其中槐米五百余萬斤，槐花二百余萬斤，槐角八百余萬斤，產值約五百四十余萬元（如图60）。



家槐一身都有很大用途。除大家都知道的木做器具，堅固耐久；皮含纖維，可以提制染料外還有槐花、槐角和槐米。槐花未開放前，呈蕾苞用勾杆扒下，叫槐米，入藥為清涼性止血藥，凡炎症出血，如：胃潰瘍出血、腸炎便血、痔瘡出血、子宮見血、赤白帶下等有效，高血壓的人常吃（用

图60 槐花(附槐角、槐米)

量2—5錢)有預防中風的效果(孕婦忌用)。花開落地後,收集起來,去掉雜質,可以做染料,還可用干粉條上色。秋天,槐豆角成熟後,用杆子打落,掃起放在席子上曬干。豆角的粘性外皮,含有17%的葡萄糖,20%的黃碱素,還含有1%的路丁。因這些東西,除了能制作工業飴糖、糖色塊和食用糖以外,黃碱素還是一種很好的黃色染料。路丁也是一種極其貴重的藥材,能治高血壓症。此外,槐豆角還含有一定數量的蛋白質、脂肪和淀粉等,能夠制造醬油等副食品。

## 燈籠

燈籠俗名“紅姑娘皮”。我省各地均產,以張專的赤城、涿鹿等縣產量較多。全省蘊藏量約五千斤,年產量約二千斤,價值二千餘元。



圖61 燈籠

它的秧高二尺左右,葉象豆角葉,有鋸齒,夏季開白色花,結紅色圓形的果實,好象小紅燈籠,果熟了以後,包着果實的一層外皮就是“燈籠”(如圖61)。

每年秋季果紅了以後就可采集燈籠,這時外皮是紅黃色,不要采綠皮的,也不要采白黃皮的,因白黃皮是枯了或着水了,不能入藥。

燈籠的用途,可用于清熱、明目、退云翳。

## 旋 复 花

旋复花俗名“山黄花”“金錢花”。全省年产量約十萬斤，价值二萬余元。旋复花是一种多年生的草本植物，秧高一尺左右，生长在野地潮湿的地方，夏秋季在莖上分枝开花，花为圓形黃色（如图62）。



图62 旋复花

每年夏秋之間趁花盛开时即可采集，将花摘下后放在广场晒干即可。

旋复花为和緩祛痰药，并且有强力的寬胸消炎作用。专治老痰坚硬、胸中痞塞、噎气、嘔逆、咳嗽、气喘、湿性肋膜炎（留飲、支飲、蓄飲）、水肿等。

## 瓜 蒂（附甜瓜子）

瓜蒂又名“苦丁香”，俗名“甜瓜把”“香瓜把”。甜瓜是一种美味的浆果，各地瓜园都有种植，不再介紹其形状。瓜和梗連接的地方叫做瓜蒂，药用的瓜蒂应为青瓜之把，苦味濃，效力大，瓜熟以后，瓜蒂苦味少效力小，为此，应在瓜未熟时将把采下晒干以作药用（如图63）。

瓜蒂有催吐作用，可治食道中夹有異物，或胃中有不消化的东西积滯，或毒物停留胃中，其他如气道夹有異物，或伪膜剥离而要咯出的。除此以外，如癇症、咳逆及水肿，而需要祛痰利水，可以吐法治疗。甜瓜籽可以潤腸止痛。



图63 瓜蒂

## 麻 黄



图64 麻黄

麻黄(如图64)。是一种雌雄异株的多年生草本。我省产量很大，但绝大部分产在張专的康保、宣化、怀安、蔚县四县，承专、唐专也产，但产量很少。全省蕴藏量约一千万斤，年产量约三百万斤，价值约十三万多元。

它的秧长一尺左右，春天生苗，开白色花，结的果实色红而圆，干了以后就变成黑色。麻黄分雌雄两种：雌的三、四月开花，六月结籽；雄的不开花，也不结籽。又分山麻黄与川麻黄两种：山麻黄生长在山坡石缝中，节短，有枝杈，颜色青黄，皮



細，好象松树枝；川麻黃生長在原野地埂上，節長，皮粗，沒有枝杈，淺綠色。山麻黃的質量好。

山麻黃的採集季節是由白露起，到第二年清明止；川麻黃的採集季節是由處暑開始。用鐮刀割下麻黃以後，去淨根子毛須，放在廣場曬干即可。

麻黃為發汗、利尿、平咳劑。適用於感冒性惡寒、發熱、無汗、頭痛、身痛、脈緊、氣喘、咳嗽、停飲、胸滿，及風水腫無汗、小便不利等症。麻黃往年行銷國外，為出口品種，近年來，主要是供應山西省國營大同麻黃素廠製作麻黃素片劑及針劑，是一項重要的工業原料。

## 薄 荷

薄荷是一種多年生的草本植物，有野生、家種兩種。我省保專安國縣每年種植面積很大，年產量達三十多萬斤，價值三萬餘元。其它專、縣所產大部為“野薄荷”，質量較栽種的次。安國所產的薄荷用化學方法提煉，每百斤能提薄荷油一斤半至一斤十二兩；用土法提煉，每百斤能提薄荷油半斤到一斤；提出的油，光亮澄清，質量很高。野薄荷出油率很低，甚至用土法提不出油來，用化學方法提出的油，質量也很次，混濁不清。

薄荷秧高約二尺左右，獨莖，沒有分枝，莖是四楞形，有節，中間是空的，表面為紫褐色，葉在節上對生，有鋸齒邊，灰綠色，很干燥，皺縮不舒坦，整個秧子都有香味，清涼（如圖65）。藥用時，如用全秧，叫“全薄荷”，如光用葉，叫“薄荷葉”。野薄荷與家種薄荷形狀不同：莖細短，有分枝，顏色發紅，葉又窄又長，鋸齒也深，雖然也有香味，但清涼味小，一般不能入藥。



图65 薄荷

的須子明年还能发芽生长。收割时，最好在早晨，避免日光蒸晒，割下以后放在广场晒到七八成干打成小捆，再移到通风的地方阴干，未干之前，要防止雨淋霜打，以免变色。

薄荷用少量有兴奋中枢神经的作用，多量能刺激脊髓，使反射机能麻痹；还可制止肠内异常发酵；外用局部有杀菌和知觉麻痹作用，内服有抑制心脏的作用。它的用途很广泛，可以治感冒、头痛、胃肠气胀；可以退热；并治胃痛、疝痛、牙痛、咽喉痛、及口疮、下痢等症。

## 紫 苏

紫苏是一种当年生的草本植物。它的叶、梗、根都供药用。我省主要产区为保专安国县。年产量：苏梗、苏根约十万斤；苏叶约五万斤，价值约二万余元。

它的秧高约二尺，叶有长把，对生，卵圆形，紫绿色，

每年收割薄荷分夏秋两季：

夏季在六月小暑前5、6天，有个别株开花时就可开镰收割，这叫“头茬薄荷”；秋季是由秋分到寒露之间收割，叫作“二茬薄荷”。薄荷的季节性很强，过早过晚收割都不合适，过早不熟，过晚开花结籽出油率低。二茬不如头茬好，出油率低，但药铺都习惯用二茬，因为色绿好看。收割时，头茬在离地一寸高的地方下镰，留下的茬还能继续发芽生长；二茬可以用手拔，断在地下的

夏秋間开紫色小花。我省安国县所产的紫苏，系栽种植物，各地虽也有野生，但产量很小，質量也次（如图66）。



图66 紫苏

每年白露节前3、4天是刨采紫苏的季节，过早采集，叶薄发灰綠色，过晚采集因养分灌注于开花結籽，叶发黄綠色，梗空心，最好在刚刚吐穗时刨采。刨采时，連根拔起，后然吊在通风处阴干，将叶摘下，剩下的梗，在分枝的地方切断，上段即为苏梗，下段即为苏根，其叶即为苏叶。

紫苏用于退热可治感冒发热，有发汗退热之效；用于鎮咳可治气管支炎，咳嗽痰多，有鎮咳祛痰之功；用于健胃可增进食欲，制止嘔气；其他还可作利尿药，鎮痛鎮靜药。梗可安胎。

## 桑 寄 生

桑寄生俗名“冬青”“倒吊草”，是一种寄生植物。桑寄生寄生在暖地不养蚕的老桑树上，它的根长在桑树枝的节上，从树皮里鑽出来。据说生长寄生的地方越长越多，是一些鳥在冬天吃了籽以后，把屎拉在树枝上，经过一夏天的湿润长出来的。这种植物高二、三尺，叶圓，很厚，柔軟，綠色，很亮，背后有一层毛茸，七、八月間結果实，紅色，好象小豆，秋后各种树叶都落了，唯独寄生却能經得起严寒不死（如图67）。我省承专、張专、保专均产，以承专产量較



图67 桑寄生

多。全省蕴藏量约二十二万斤，年产量约十万余斤，价值三万余元。

每年冬季是采集桑寄生的季节，采集时，上树用刀将寄生砍下，放在通风处阴干即可。

桑寄生为强壮剂。适用于腰痠背痛、足膝痠软、衰弱性之关节痛等症，兼能安胎及治疗高血压。

## 香 薷

香薷是一种当年生的草本植物。主要产在我省保专安国县，每年种植一定亩数。年产量约二十万斤，价值三万余元。

它的秧高1—3尺，梗为四楞形，叶是对生（并生），卵圆形，边缘有锯齿，梗和叶都有一层毛茸，春天开紫色小花，形状好象嘴唇，远看为穗状，气味很香。它的全草就是“香薷”（如图68）。



图68 香薷

根据安国县的种植习惯，分春播夏播两种：春播的处暑成熟；夏播的白露成熟。秧子变



成黄色就是成熟了。采集时，連根拔起，然后放在广场晒干即可。

香薷有利尿作用和发汗、健胃作用。治疗全身水肿、颜面浮肿、脚气浮肿及小便不利。并可发汗治暑热。止鼻衄。还可用于急性胃炎、吐泻、口臭等症。

## 紫花地丁

紫花地丁俗名“地丁”，是一种当年生的草本植物。我省保专安国县每年均种植一定亩数，完县、淅水、易县、满城也有野生地丁，但产量不大。全省年产量约一万斤，价值五千余元。

它的秧高约一尺左右，又细又长，分枝很多，很柔软，叶互生（交叉生长），分裂成三片，好象羽毛一样，夏天在叶把的地方开紫色小花，花的形状好象嘴唇，结的果实长椭圆形，果内有籽（如图69）。




图69 紫花地丁

采集地丁的季节在每年六月间，半籽半花的时候最适宜，过早采集未成熟，过晚采集叶子就枯萎雕落了。我省安国县种植地丁，都是与小麦间作，不单独种植，因单种产量小成本高。采集方法是用镰刀割或用锄头耨，然后去净泥土杂草，晒至七、八成干捆成小把，捆好再晒，到十成干即可。

紫花地丁为清凉性解热、解毒、消炎剂。专治败血性炎症、

化膿性炎症，高热煩躁，痛肿疽痛、疔疮膿瘍等症，內服外敷（生根搗敷，能吸出膿液）很有效力。

## 瞿 麦

瞿麦俗名“十样景”“石竹子花”，是一种多年生家种或野生的宿根草本植物。我省保专安国县每年均种植一定亩数，其余各专都有野生。全省蕴藏量約三十万斤，年产量約三万斤，价值約三千余元。



图70 瞿麦

它的秧高一尺左右，叶很窄，形状象针，对生（并生）夏秋之間在梢上开花，五瓣，黄綠色，形状象个小圓筒子，結的籽好象麦粒。药用它的全秧（如图70）。

收割瞿麦的季节，分为头、二、三茬；头茬在芒种前后；二茬在大暑前后；三茬在秋分前后。收割时用镰刀平地割下，然后放在广场晒干打捆即可。

瞿麦为利尿药，兼有凉血、消炎作用。适用于膀胱炎、淋病、尿道炎、膀胱出血、小便出血、小便困难等症。又有通經作用，还可以治疗痛疽、疔疮。

## 荆 芥

俗名鷄骨子杆，四楞杆蒿。我省山区各县均产。以保定、唐山、張家口、承德等专区的陝源、易县、唐县、薊县、平谷、密云、怀柔、房山、迁西、龙关、延庆等县为主

要产县，安国有部分人工栽培。全省蕴藏量约为二百万斤，年产量一百二十万斤左右，产值约十二万元。

荆芥秧高三尺多，叶有把，分裂成几片，好象羽毛一样，夏天开白色小花，系麦穗一样，梗方楞，外皮紫红色，花落剩穗，长约二寸左右，毛绿色，芳香气味浓厚。叶、梗为荆芥，穗为荆穗。（如图71）多生长于潮湿有水地带，秋季，用镰刀在离地一尺高处




图71 荆芥

切断，不要老梗，如荆芥与芥穗分用，可将穗摘下，为防止香气走失，不要在烈日下曝晒，也不要用火烘烤，放在通风处吹干。但注意一种带有臭味的荆芥，秧红紫色，不能用。安国县人工栽培的外形与野生的不同，秧矮约一、二尺高，穗上子稀疏，梗细，分叉多，穗长约五、七寸，香气较薄。

荆芥入药系驱风退热良药，专治流行性感、头痛、眩晕、呕吐及皮肤痛痒

等症。如国家全部收购，不仅可满足全省人民疾病需要，而且能给农民增加收入约八万元。

## 益母草（附茺蔚子）

益母草俗名“风葫蘆草”“四楞蒿”，是一种当年野生的草本植物。我省各地均产，以张专、保专、石专产量较

大。全省蘊藏量：益母草約二百万斤，茺蔚子約十萬斤。年產量：草約二十萬斤，子約二萬斤。價值共約二萬餘元。

它的秧高二尺左右，莖為四楞形，葉分裂成三片至數片，開紅紫色花，花的形狀好像嘴唇。地上的秧就是“益母草”；所結之籽就是“茺蔚子”（如图72）。大多生長在平原地帶。



图72 益母草

每年夏季收草，秋季收籽。收草時在剛開花時割取，少帶老梗，割下後曬到六、七成干，捆成小捆，再陰至十成干即可。

益母草的用途很广泛：用于通經，可以活血、調經、治月經不調及產後子宮充血；用于降壓，可治療動脈硬化性和神經性的高血壓；用于止血，可治療產後子宮出血，或崩中漏下，月經久而不止，可以立止；用于消炎，可应用于子宮內膜炎所致的粘液分泌物，及產後液狀排泄物久而不止，并可作乳痛、疔腫、丹毒藥；用于催生，子宮收縮時，能增加緊張性陣痛，排擠胎兒下降，可作臨產催生藥；用作利尿，可治心臟性和腎臟性的水腫，為消水退腫之效；除此以外，還可作為鎮靜藥、瀉下藥、強壯藥和解毒藥。

茺蔚子功能通經和收縮子宮、變質解熱等。尚有利尿及治眼疾的效力。



## 桑枝 桑叶 桑皮

桑枝就是桑树的嫩枝，又叫风条；桑叶就是霜打以后的桑树叶，又叫霜桑叶；桑皮就是桑树根的皮，又叫桑白皮。桑树，我省各地均有。蕴藏量：桑枝约二十余万斤；桑叶约八十余万斤；桑皮约二十余万斤。年产量：桑枝约三万余斤；桑叶约十万斤；桑皮约五万斤。价值共约二万余元。

生产季节：桑枝在每年秋季；桑叶在秋末冬初下霜以后；桑皮在四、五月间采集。桑枝用刀砍下以后晒干即可；桑叶等到霜打落叶以后，用针或竹针引线穿起来即可；剥桑皮

时，先用刀横着在树根上打节，再竖着切开，然后用刀或碗盆刮净外层老黑皮，将皮扒下晒干即可。

桑枝主治关节风湿痛、及高血压、手足麻木等症；桑叶为发表解热药，镇咳祛痰药，及治眼结膜炎等症；桑皮为利尿镇咳药，治水肿、喘咳有痰，并可降低血糖，治糖尿病（如图73）。



图73 桑树

## 大薊 小薊

大小薊俗名“刺兒菜”。我省各地普遍生长，产区不分主次。全省蘊藏量約四百多万斤，年产量約二十万斤，价值約四万余元。

大薊遍于田野，秧高一尺左右，叶是卵圓形，有刺，互生（交叉生长）莖端开紫色花，花瓣丛聚，外面好象鱗片，它的莖、叶、花均供藥用，叫做“大薊”（如图74）。小薊大多生长在湿潤的地方，叶好象羽毛，有很深的裂紋，不开花（如图75）。



图74 大薊



图75 小薊

每年夏季用鎌刀割秧，割下后晒干即可。

大薊为止血藥，兼有清热、破瘀、治炎、利尿作用。适用于热性病出血症、吐血、衄血等症，用于痛瘍、瘰癧、有消炎、去瘀生新之效（鮮者搗汁更佳）。小薊与大薊作用相同。但功效較弱，无消肿的效力。

## 茵 陳

茵陳俗名“小白蒿”，是一种多年野生的草本植物。我省各地皆产，以張专、保专、石专、邢专产量較大。全省蘊藏量約五十余万斤，年产量約五万余斤，价值一万余元。

它的秧仅有二、三寸高，叶細长，密生一层白毛，好象一把碎綫，夏秋之間开白色穗状小花，花落后結籽，好象芥子（如图76）。藥用地上的全秧。一般多长在山野、地埂、干河滩、村边等地。

采集季节在每年春季三月，俗語說：“三月茵陳四月蒿”，必須抓住季节，秧子一窜苔就过季了，不能入藥。采集时，用手拔，拔出以后把根去掉，放在通风的地方阴干即可。

茵陳有促进胆汁的分泌作用。为发汗、解热、利尿、淨血藥。适用于黄疸、肝硬变、肝郁血、胆石，胆囊炎及腸热初起、回归热等各种急性热病，并对驅虫有效。



图76 茵陳

## 蒲 公 英

蒲公英俗名“把兒英”，是一种多年野生的草本植物。我省各地均产，产区不分主次。全省蘊藏量約五百万斤，年产量約三十万斤，价值三万余元。

它的秧鋪地而生，沿根生叶，叶是长形，爬在地面上，




图77 蒲公英

独梗，开黄色花，花为圆形，有很多瓣（如图77）。药用地上的全秧。

每年春秋两季都可采集。采集时，可用小锄鏟，去根去土，花叶齐全不散秧，晒到六、七成干，再阴至十成干即可。

蒲公英有健胃作用，并能刺激肠的蠕动，使大便易于排出。用于消化不良、胃炎、胃痛有消炎止痛之功；并治疗疮、肿毒、乳腺炎、淋巴腺炎。解汁外用可解蛇咬毒。除此以外，还可作为缓和泻下药、利尿药及解热药。

## 艾 叶

艾叶俗名“艾蒿”，是一种多年野生的草本植物。我省各地均产，以张专、承专产量较多。全省蕴藏量约一百万斤，年产量约二十万斤，价值二万余元。

它的秧高二尺左右，叶互生（交叉生长）长圆形，分裂成数片，叶的背面生很多毛，灰白色，正面为深绿色，味很香，夏秋之间开淡褐色的小花。药用其叶（如图78）。




图78 艾叶



每年旧历五月端阳节以后就可采叶，采回以后放在席子上晒到六、七成干，再阴至十成干即可。

艾叶有兴奋中枢神经、增进食欲、解热、和收缩血管止血作用。可治子宫出血、痔疮出血、肠出血、及吐血、衄血等症；并治食欲不振及消化不良；除此以外，还可作解热剂、调经剂、驱虫剂、及治少女萎黄病等。

## 侧柏叶

侧柏树是一种常绿灌木。侧柏叶就是树身上长出的小嫩枝和嫩叶（如图79）。我省各地均产，以石专、承专产量较多。

全省蕴藏量约六十万斤，年产量约八万斤，价值1万余元。

每年夏季初，用剪子剪叶，不带老梗，剪下以后放在席上晒到七、八成干，再阴到十成干即可。

侧柏叶有健胃和收缩血管作用。用于止血，可治咳血、吐血、衄血、尿血、肠出血、子宫出血及赤痢等症；除此以外，还治妇女带下。可作苦味健胃药，及淋疾利尿药。



图79 侧柏叶

## 泽兰叶

泽兰叶俗名“地蒭蘆”“地柳子”，是一种野生的宿根

草。我省各地均产，以天津专区的武清、永清县及張专的蔚县、怀来产量較多。全省蘊藏量約三十余万斤，年产量約五万斤，价值1万余元。



图80 泽兰叶

它的秧高二、三尺，梗为四楞形，有空心，紫色，叶象薄荷叶，秋天开白色或淺紫色花。药用全秧（如图80）。

每年夏天，趁澤兰开花时，用鎌刀割取上半截带叶的秧子，割下后晒干即可。

澤兰叶为去瘀、調經药，兼有利尿作用。适用于月經不調、产后瘀血不尽，及产后血虛、水肿等症。

## 五 加 皮

五加皮俗名（如图81）。“洋条稍”“羊角叶”。是一种自生在山野的落叶灌木。我省各地均产，以張专的涿鹿、怀来、蔚县产量較大。全省蘊藏約五十万斤，年产量約七万余斤，价值三万余元。

这种灌木高約三至五尺，枝干上有很多刺、叶象桃叶，光亮，夏天开黃綠色小花，五瓣，形状好象一把小伞，花落以后結



图81 五加皮

白黄色球形的浆果。它的根皮就是五加皮。

刨采五加皮的季节分春秋两季：春季由清明起，到芒种止；秋季由白露起，到地冻止。用鐮刨出根子以后，去掉秧子，光要根，然后趁湿用木棒砸，砸皮离骨，将骨心抽出，只要皮，将杂物拣出，将皮晒干即可。

五加皮含有甲乙种维生素，具有营养作用。可作麻醉药及强壮药，对阴萎有效。还可以治疗疝气、腹痛、骨节疼痛等症。

## 黄 柏

黄柏是一种落叶乔木。我省各地均产，以承专、张专产量较多。全省蕴藏量约二十余万斤，年产量约五万余斤，价值二万余元。高一丈左右，生长在深山。树干的外皮自行碎裂，灰黄色。树叶对生，椭圆形，边缘有细锯齿。夏天在顶上开浅黄色小花，果实成熟后为黑色，球形，里面有核。树干的外皮就是“黄柏”（如图82）。



图82 黄柏

每年夏季是剥采黄柏的季节。先在黄柏树上横着打节，再竖着切开，然后用碗岔或小刀刮净外层老皮，将黄色树皮扒下晒干即可。打节时尽量打大片，省工、好拿。


黄柏用作健胃整肠，可治腹痛及消化不良；用作抗菌解热，可治细菌性痢疾、热性黄疸及眼结膜炎等；除此以外，还可治跌打损伤，和赋形药敷贴伤处。

## 陈 皮

陈皮俗名“橘子皮”。橘子是一种美味的水果，我省各地均有出售。由于吃橘子时，一般都将橘皮随手扔掉，所以全省每年共扔掉多少橘皮，尚无法统计。

为了把这一笔为数巨大的橘皮积攒起来，支持医疗用药，吃橘子时，先用小刀将整个橘子由上至下轻轻划成四瓣，用力不要过大，只要将橘皮划破即可，然后剥开，取出橘瓣，吃完橘瓣以后，将橘皮压扁晒干，就是“陈皮”（如图83）。

药用部分



橘瓣里的籽和橘皮里面的纤维（丝）都是药材，前者叫“橘核”，后者叫“橘络”，也可以积攒起来卖给药铺。

陈皮能够刺激胃粘膜，使分泌过多，运动加速。系芳香性健胃药可治疗胃弛缓、神经性胃病、急性胃肠炎、呕吐、腹泻、消化不良、食欲不振等症；用作镇咳祛痰药，可治伤风咳嗽有效。

图83 陈皮

橘核治小肠疝气及睾丸肿痛。橘络治口渴、呕吐。

## 白 鲜 皮

白鲜皮为一种野生的亚灌木的根皮。主要产在我省的张专、承专各县。全省蕴藏量约二十万斤，年产量约五万余斤，价值二万余元。



这种小树高約二尺左右，叶是卵圓形，邊緣有鋸齒，夏天开花，粉白色，有紅条紋，很香，結的果实好象花椒，根象小蔓菁（如图84）。



图84 白鮮皮

每年夏至到立秋是剥取白鮮皮的季节。先用鐮將根刨出，去掉树秧和根上的毛須，用水洗去泥土，用碗岔刮淨外层的黑皮，然后用木棒砸，砸到皮离骨，抽去木心，將皮晒到十成干即可。

白鮮皮有退热、鎮靜、通經的作用。治疗妇人产后热病及其他热性病；并治小兒惊癇；及妇人月經不調或經閉；除此以外，还治阴部肿痛，产后余痛，并可作为变質药，治疥癬、眉須脫落及黄疸病、淋病。

## 冬瓜皮 冬瓜子

冬瓜是一种菜蔬，我省各地菜园均有种植，产量巨大。冬瓜皮和冬瓜子都是药材。

作菜时，用快刀將冬瓜皮削下，但削时要尽量削大片，削下后晒干即可。冬瓜籽將瓢去掉，將籽洗淨晒干即可。

冬瓜皮有利尿作用，适用于肾脏炎。冬瓜子也为利尿剂，但兼有消炎作用，适用于肾脏炎、小便不利、小便热痛等症，內脏膿瘍也有使用冬瓜子的（如图85）。




图85 冬瓜子皮

## 全 蝎

蝎子是有毒的昆虫，头部胸短，无关节，胸部有脚四对，腹部较长，前腹由七个关节组成，后腹部由六个关节组成，最后尾节有毒囊，尾尖有毒钩螫人，青黄色，雌蝎毒性较强。由于入药用其全部，故叫全蝎，又称全虫。北方夏季多蝎，春秋较少。它习惯生活在山上大石底下，墙缝、碎乱砖石堆中。入山捕捉时，先代一罐子，一付筷子，一把扇子，在伏天尤为适宜，搬去石头将蝎用筷子挟入罐中，如蝎子过多一时四处乱爬，用扇大力扇风蝎即卷缩不动；在庭院中捕捉最好在夜晚，挂灯于墙角或墙根，蝎子从缝隙中鑽出奔向亮光处捕找食物，即可逐个拿下。由于这种捕捉方法不能保持大量生产，现在养蝎大量繁殖已在各地实行，其中以河南省唐河县刘德三的方法较为全面，兹附于后。目前国内大量需要。

全蝎每两约80余个，捉回后，按下面办法进行简要加

工。將活蝎子放入鹽水中，待它喝水後，就把肚中的泥土吐出，趁它未死，再將它盛入鹽水鍋內（每斤蝎子用二兩鹽），蓋好鍋，壓住蝎子（以免它死卷縮），燒開水後撈出，捋直曬干，即為成品（如圖86）。



圖86 全蝎

蝎子含有毒性蛋白質和其它化學成分，入藥用干鎮痙，治小兒驚癇抽搐及破傷風痙攣，大人中風、半身不遂等，其它治疝氣、耳聾、感冒等，外用諸瘡毒腫、痔瘡發痒。

附一：治蛇咬解毒：用蝎子20個，投入一斤扁桃油浸漬塗于咬處即可。

附二：治毒瘡毒腫：用蝎子7個，梔子7枚，麻油煎黑黑滓，加入黃蜡使之成膏敷之即可。（淡蜜方）

附三：治痔瘡發痒：用全蝎燒成烟熏患處有特效。（慎初方）

附四：全蝎繁殖經驗介紹：

### 劉德三培養全蝎經驗

#### 一、畜養房的構造：

1、畜養房，俗稱蝎子籠，象一間平房高約五尺，房頂用木、瓦或草蓋成，周圍牆壁用土坯砌成，土坯須留一寸左右的縫隙，牆的外壁用泥漿搪糊，牆的里边不搪糊，不設窗戶，前牆中部可留一長六形單扇木門，關後不要露縫，門兩側約二尺遠地方，離地五寸高，前後各留八寸高，兩寸寬的

小洞两个，使蝎子出入及流通空气。房內最好使用老牆的旧土坯堵严，靠門处留一方掉大小空地，房內堵土坯时，象垒墙一样堵到房頂，土坯間隔距离要比牆壁距离稍大一点，約留一寸半左右的空隙，土坯的堵法和砌墙一样。

2、全蝎的保护法：畜养房宜盖在靠近民房处，便于看管免被其它动物咬伤。畜养房的周圍距墙根一尺远处，挖一道水沟，用水泥磚或石灰筑成，以不漏水为原则。沟的深寬各約一尺，沟的靠墙一角修成斜坡，直到墙根。这样夏天可使蝎子順坡爬下喝水，如坡度过陡，会使蝎子掉入水沟內淹死，因全蝎子怕水，不能外逃，同时也要防止其它小动物到房內吃它（如：鷄、鴨等）。靠水沟的一角可修一方池，作貯水使用，夏季沟內要經常換水，不使水中断或干完，否則会在一夜之內全部越沟逃走。蝎子夏季出来喝水或乘凉时，注意不要阻碍。

## 二、繁殖方法：

一籠下种十斤左右，放入房內不宜过多，因它不是一处收来，易互相咬伤（如：采用烟熏法或可防止）。它的繁殖量，每斤每年能繁殖十斤上下（一个母蝎年生子一次約十八个）。

## 三、飼料：

蝎子喜食碱土、夫皮，小谷子及各种小昆虫，在夏季将籠房門打开，門里边放一小灯，吸引小虫飞进，这样可解决一部分飼料，飼喂糠皮、小谷子时，可撒在坯縫中（主要因为它喜食碱土）。冬季可用土坯将門砌严。

## 四、收获法：

最好隔一年收获一次，可于立秋后进行。收获办法先把門打开，前后牆上的小洞堵严，然后用酒向內噴，噴罢把門



关严，准备好四个光滑的脸盆（要以全蝎不易爬出为准），和装蝎子用的铁桶或水缸，然后把四个小洞打开，蝎子因屋内酒气太重，即顺着洞口大量向外爬出，这时一面用盆接好，一面迅速向桶内倒，收捕时要把沟内的水放满，拿盆子的人最好站在水沟外边，防止向身上爬，以免螫人。

#### 五、加工法：

用铁锅将开水煮沸，把蝎子投入沸水内，捞出晾干即成淡全蝎。另一法同前介绍，但加盐于冷水中（约一斤用盐二两）防止用冷盐水侵死，煮时不宜放蝎子过多以防煮不透，容易发霉。两法以盐蝎子较好，能防止发霉长期保存。

## 五 灵 脂

五灵脂俗名是寒号鸟屎。寒号鸟象很大的蝙蝠，其头如猫，大的约10余斤重，吃松树、柏树等的树籽，叫声如人说话，夏季羽毛很多，冬季羽毛稀少，天冷时喜晒太阳，性懒，不会搭窝，住在大山悬崖绝壁上的石窟窿里，冬季窝吃窝拉，吃的是自己拉的屎。它无论飞离洞中多远，也回到窝里拉屎，头次拉的屎叫灵脂米，吃了“屎”再拉出来的是稀的日久成块，是为灵脂块。因它吃的是松、柏树之籽，所以拉出的屎，外面油光色，好象松香作的，色黑气味燥恶。我省各地均产，以保定、张家口、石家庄、邢台等专区的涞水、涞源、阜平、赤城、蔚县、邢台、内丘等地为主要产区，约蕴藏三十万斤，年产十万斤。四季内都可挖采，但因寒号鸟住在大山石崖绝壁的石缝中，采集时石缝（或石穴）离地面很高，无法攀登而上，必须绕到上顶，用大绳一根，搭勾一个，口袋一条，将绳子拴牢，将人及搭勾，口袋顺线放下，到石缝相等之处，用力摆动，以搭勾搭住洞口，进入

石窟內去取，取完灵脂后，再将人和灵脂陸續放到山根。繩子要长，粗大结实，以免发生危險。

寒号鳥喜欢吃松、柏籽，尚未完全消化，含有多量树脂，吃后，会使人的白血球增加，所以是妇科通經、活血、止痛、散瘀的良葯，主治月經过多、胸痛、肋痛、腕痛、肚疼、产后瘀血等病症。

## 鷄 內 金

鷄內金俗名是鷄肫、化食胆。是鷄胃里的一层皮內膜，遍圓形，有很多縐紋，有青、黄二种顏色，鷄所吃的东西都經過这个胃膜消化，把养料輸送到各个需要的地方去，它的消化力特別强，有时吃了硬壳的东西或者是小石子，也能很快的消化掉（如图87）。在逢年过节或喜庆的日子里，人們

都喜欢用鷄肉做菜，这时人們不仅可以吃到味美、营养丰富的鷄肉，而且还能收集很多鷄內金。宰鷄开膛，取出鷄胃等以后，把鷄胃翻过来，将里面的食物及石子等倒干淨，然后用清水洗一下，就会看到一层青色、黄色或青黄的皮內膜粘在胃上，这就是鷄內金。往下撕的时候不要用力过猛，防止裂碎，慢慢地撕下来，就是一个整个的鷄內金，用水洗淨后，晒干就成为成品。我



图87 鷄內金

省不論山区还是平原，差不多家家户户都有鷄，但过去沒有积存鷄內金的习惯，認為一斤能值五元来錢，一个鷄的內金

才值几分錢，往往被扔掉不要了。因此国家收購的很少，个别一些葯材收購部門也不够重視，認為这是小宗，收不收都行，收一星半点沒处放等等，而沒有看到它在經濟上和葯用上的价值。这些想法都影响人民用葯需要。

鷄內金不仅价值高，而且也是治消化不良(停食停水)，不思飲食、反胃瀉痢，小便頻遺等的良葯，特別对帮助消化，开胃进食，消积食有卓越效果，除国内大量需要外，并能大量出口，消灭疾病。

## 牛 苦 胆

牛苦胆就是牛的苦胆，生长在牛的肝脏上。牛苦胆有大有小，大的如同西瓜，小的如同鷄蛋，胆内有胆汁，是一种带有粘胶性的液体，深綠色或棕綠色，味臭而苦。杀牛时，取胆要十分小心，不要碰破胆囊，碰破了会使胆汁大量流失，洒在食物上不能食用。割下苦胆后，用麻繩把胆囊口捆紧，先放于干淨的洋鉄桶或罐子里，不要晒干，貯存時間也不要太长，以防夏天生蛆变质不能葯用。

胆汁含有胆盐、胆汁酸、胆色素、蛋白、脂肪等化学成份，味苦寒，有腥气，是利胆、小腸防腐良葯，对治疗消化不良，慢性胃炎及肝脏病有显著效果，也有除心热，止拉痢疾，明目，清五脏的功效。

## 牛 黄

牛黄是一种名貴的葯材，对人类的貢獻很大。它是牛胆囊中的硬結石，长在牛的胆囊里或肝頁上，很少长在腸子里，系圓球形或方形的块状物，好象鷄蛋黃，黃色，有的大如鷄蛋，有的小如黃豆粒，用手摸很輕軟。长有“黃”的

牛，普通是十岁以上或者生有胆石病的牛，身体瘦弱，走路低头，目光无力，起卧都发出哮喘的声音。有牛黄的牛都有这种病状，但有这种病状的牛不全都有牛黄。在杀牛时，要注意看牛胆囊中或肝页上是否有黄。如发现胆囊里有硬块，好象核子一样，那可能就是牛黄，要细心地剖开取出。取出的牛黄不要在日光下曝晒。最好放在盘子里阴干，八成干的就是成品。

牛黄是清凉性解毒、镇痉、解热的要药，味清香，如用吐沫粘点牛黄涂在指甲上，手指立刻觉得发凉，透甲，不易擦掉黄色。它含有胆汁、胆色素、铁质等化学成分，主治各种热性急病，如：因高热所致精神不安、神精错乱、谵妄、烦躁、发狂等症，不但有清热镇静的作用，而且有安神的显著效果，对治肺炎高热、伤寒，和治小孩惊风、抽搐、破伤风等症，以及对消炎、解毒，也有巨大效果。



药用部分




图88 牛黄

牛黄是我国人民所急需的药材，产量小，用量大，供不应求，每年都需要从印度和中东国家进口一部分，同时价值也很高，每两约百元左右，因此，注意收集是有重要意义的。特别是我省北部的草原区，如张家口、承德专区的沽源、商都、张北、围场、丰宁等地，更应积极发现牛黄，让每一滴一点“黄”，都来给人类造福。保障人民身体健康（如图88）。



## 豹 骨

豹是一种与虎同类的勇猛凶残的野兽，体小于虎，大的也不超过二百斤。我省所产之豹一般在百斤以内，习惯生活在深山老林区，产量极少。

豹身披黄褐色带有铜钱大黑色斑点的皮，俗称“金钱豹”，它和虎长的相同，有长圆形的头，嘴巴上有门牙三对，犬牙一对，臼牙三对。脖骨有二节，为蝶形，接着是脊梁骨二十四节，肋骨十三根，尾骨没一定准确数，一般为双数二十二至二十六节，连接四肢者为一块独骨，下节是两骨合成。下节两骨合成的是腿骨，俗称“川四腿”，前腿足上有五趾，后腿足上有四趾，每趾末端有锐利的钩爪，后足后部一趾无爪，俗称前五后四。与虎不同的地方是头比虎头长，犬齿老，多锈，骨胳细。将豹打死后，扒去豹皮，提肉取骨，骨呈黄色的为佳。四腿中以膝骨（又称胫骨）最好。由于豹骨比虎骨产量多，过去都去掉整体，只要四条腿，充虎骨用，疗效稍低于虎骨，功能祛风散寒活血除湿，治疗对受风寒所得的腰腿麻木、筋骨疼痛、瘫痪、半身不遂等症有显著效果。豹骨多做酒浸剂，为虎骨药酒必备原料。每架豹骨十至二十斤，价值近百元。

## 刺 猬 皮

刺猬皮俗名是猬皮。刺猬是生活在山林或平原地带的一种小动物，它的身体很短很肥，身长五寸至一尺，腿和尾巴也很短，全身密生针状刺毛，只有腹部是软毛，它的身体能够自由伸缩，如遇到猛兽或敌人就立刻卷缩一起，用它的象倒栽的针一样的外皮来保护自己，皮就是刺猬皮（如图

89)。刺猬喜欢夜间活动，多鑽在豆地、瓜地或柴禾垛内，



图89 刺猬皮

捕捉时，要事先在地边挖个坑，然后拿手电筒在地里寻找，捉一个往坑里扔一个，它不易爬出来。天亮后，再进行加工，先用两条繩把刺猬的两条后腿捆住，然后用脚踩住头，把两条后腿拉开，用刀开膛，去头去四腿，再去掉腹内杂物，用刀将肉刮净，摊平晒干就行。我省各地均产刺猬，以滄县、天津二专区的安次，任丘、永清等县为主要产区。全省約有刺猬五万余个，产量約二万余斤。

刺猬皮是止血、疗痔的良药，对治胃潰瘍出血、痔疮出血，腸风便血、腸出血、赤白带下，遺精等症有显著效果。

## 蛇 蛻 (又名龙衣)

蛇蛻俗名是长虫皮，我省各地均产，年产二千余斤，約三十余万条。通常每两約十余条，小条也有二十余条。

蛇蛻多发现在深山巨石和老屋之内，蛇栖居的地方。蛇是有毒的冷血动物，龙头虎口，形象凶恶，冬季入蛰，春季惊蛰出来，每年夏季脱皮一次，由药农从山中捡回，去掉泥土，晒干，即为“龙衣”（如图90）。



图90 蛇蛻

蛇性毒，但入药却是一位最得力的攻毒猛将军，除对镇痉有特效外（即神经紧张或兴奋过度，使之趋于安静，迟缓），还主治恶风癩疾，驱除梅毒、瘰癧、筋脉拘急、口眼歪斜、半身不遂及各种恶毒疮疥癬。

## 蟬 蛻

蟬蛻俗名是虫退、吉了皮、秦吉了皮等，我省各地均产，年产二万余斤。

蟬是一种带有翅膀的小昆虫，体长一寸左右，头部稍方，胸部有明晶翅膀一对，夏天喜长鸣，声大，它所脱之皮叫蟬蛻（如图91），以热伏天产的质好量多，伏凉皮不能用。

蟬多生活在树上，脱皮于树下或树干树枝上，收集时要



藥用部分

图91 蟬蛻 (土名: 吉了皮)

保持整个不要捏碎。色淡黄，光洁，輕浮的为佳。

蟬蛻对治疗感冒性热病、头痛、无汗、失音，咽喉肿痛，目赤翳障和各种疹子、小兒惊癇、妇女产褥等等病症都有效。蟬蛻人人皆可收集，每斤值四元多。

## 虻 虫

虻虫俗名是牛膝蛄虫、牛虻，是一种带翅的昆虫，体长半寸左右，黑褐色，比蜜蜂稍微大一点，肚大扁凹形，嘴上长有吸血针，用它来食牲畜血维持生命(如图92)。我省北部草原区張家口、承德两专区此虫較多，夏天多寄生在牧养場所，可吸牛、馬、驢、騾的血，常飞翔在牲畜的左右。捕捉时，用蝇拍最好，当虻虫靠近畜身或叮食血时，拍打，但用力不宜过猛，以免打烂，然后入瓶悶死，再倒出阴干。張家口专区沽源县牧民的經驗是：中午下地回家后，将牛牵到玻璃窗前阳光下去晒，很招虻虫，不一会就会飞来



图92 虻虫




很多虻虫落在牛身上，用拍一哄，虫便奔向玻璃窗，再用針在玻璃窗上一个一个刺捉，然后放入瓶內悶死，再倒出阴干。晚上捉时，窗內点一盞灯。

虻虫是农、牧民一項很好的收入，每斤价值十五元左右，而且不需要什么本錢，我省年产三千五百斤。虻虫入药主治破血、化瘀、通經等症。因虻虫口內含有一种特殊的粘液，能把血液溶化开变淡，容易吸收，所以破瘀血，活血的功効最为显著。

## 蜂 房

蜂房俗名是馬蜂窩或蜂窩，我省各地均产，年产三万余斤。

蜂房长在寺院、楼塔、房屋的檐下，或棚頂下，灰色，圓形，好象倒挂着的蓮蓬一样（如图93）。




蜂房在全省各地都有馬蜂喜欢夏天扩巢。采集时，用木棒将蜂房撬落，将馬蜂兒子及死蜂摘出，即为成品。

蜂房是外科专用药，治疗疔疽、瘰癧、黄水疮、癬等有特效。据調查我省可产三万余斤，是一項很值得收集的药品。

图93 蜂房

## 夜明砂

夜明砂俗名是蝙蝠糞，我省各地均產，年產量在二十萬斤左右。



藥用部分



图94 夜明砂

夜明砂多在山洞、石窟、老房、鼓楼里。蝙蝠系日盲夜出的鳥，拉的尿两头尖，黑褐色，形状象老鼠尿，里面含有未消化的小虫，如蚊子、萤火虫等（如图94）。

夜明砂是眼科良藥，治內外障翳，青盲眼、雀目眼等有特效，又可治小兒疳積、惊癇等病症。同时也是最好的上地肥料，比人糞肥效高数倍。

## 紫河車

紫河車就是胎盤，俗稱人胎胞或胎衣。

紫河車对治疗气血虛損，神經衰弱有卓越效果，是一种著名良藥。过去人們不了解紫河車在藥中的巨大貢獻，都按旧習慣把它擲掉了，致在医药需要上感到缺乏，因此，我們必須珍惜和收集这一項財富，讓它为人类健康服务。

胎兒生下来之后的胎衣，有紅、白、紫三种顏色，血多者

成紅紫色，入藥全能用（各地商業藥材部門都收），以紅紫色的為上品。成品是圓形或橢圓形的，堅硬，呈赤褐色，約長三至五寸，寬約三寸左右，底層有膜皮及臍帶根，紫灰色，無腥臭味。它的加工方法也很簡單，新鮮的胎盤用清水把外皮惡血和污物（如草紙、白棉等）洗淨，刮去胎盤外面的一層薄薄的外皮，再放清水內，用手輕輕地揉洗，將靠近臍帶處的两个血筋用針挑破，使血胎反面很多條血管內的瘀血流盡，一直洗到把所有瘀血排出為止。這時胎盤的顏色已成微白帶紅色，倒入盛清水的盆或缸內浸漂，並根據氣候的冷熱，每天要換水二至三次在每次換水時，可再輕輕的揉搓使瘀血繼續外流干淨，一般在夏天浸漂一至二天，冬天漂四至六天，要防止腐爛，以血淨水清，胎盤浮于水面，達到浩白色為標準，浸時可放在陰涼處，嚴防貓狗鼠咬食，到標準時取出，放在盛物的盆內濾盡水，再放入開水鍋內煮（最好用沙鍋煮），煮的時間不要太長也不宜過短，當胎盤漂浮在水面上就開鍋撈出，一般在三至五分鐘，煮時要勤翻，以免煮不透或發焦。撈出後用清水洗淨，用剪子把熟胎盤修理光潔，把臍帶盤放到熟胎盤的正中，用炭火烘乾即成成品。在用水上注意不要用河中的泥污水或加了漂白粉的自來水，用了會使胎盤發黑發臭。通常紫河車浸入水中無雜質，曬干分量不減少的就是真品。

紫河車味稍有腥氣，性溫無毒，功能補氣血，治男女身體虛弱，有損元氣，勞累過度，不能生育等，適合治療各種慢性衰弱病症，如結核病身體瘦弱，盜汗，咳嗽，神經衰弱，記憶衰退，陽物萎縮不起，不孕，無乳等症。把清潔胎盤放在低溫下焙乾燥後弄成面應用。紫河車丸（市上藥店均售）系紫河車配人參、熟地等制成的，專治虛軟病。每個胎盤

价值一元多，我省各县、乡、镇和公社医院（医院、产院）接生站、保健站、接生员都应大量收集，以利国便民。

## 猪 苓

猪苓俗名是“野猪粪”。我省主要产区为张专的赤城、蔚县两县，年产量约三万斤，价值四万余元。猪苓是寄生在樺树、楓树根間的一种菌块，地上无苗，离地皮一尺来深，为不定形的块状，外皮黑褐色，好象猪尿一样，所以叫做“猪苓”（如图95）。




图95 猪苓

采猪苓不分季节，但夏秋雨季好找。根据赤城、蔚县刨采經驗，生长猪苓的地方，土壤肥沃发黑，长草粗大而黑，下雨以后，雨水渗的很快，地皮顿时干燥，可能是猪苓吸收了大量水分。一般农民都是在雨后去寻找，根据地皮干湿判断猪苓所在地。一般是刨开土壤以后，土壤不散，就可以繼續往下挖。猪苓大多是一窝一窝的生长，两层三层不等，一窝重三、五斤至七、八斤，有时更多。刨出以后，将粘在上面的小石渣、泥土去淨，晒干即可。

猪苓含有苹果酸，具有利尿作用。治水肿、淋病及糖尿病、口渴等症。

由于猪苓无固定产量，又不能栽植，故价值較貴，市場上供不应求。然而它是出口品种，能为国家换取外汇，故应积极挖掘貨源大力生产。



## 赭 石

赭石俗名是“紅石头”，是一种矿产。它的质量很硬，成块状，捣碎以后，成赤褐色的粉末，結晶体的叫做輝鉄矿赭石，半結晶体的叫做赤鉄矿赭石，表面有瘤子样的叫做釘头赭石（如图96）。我省所产的是釘头赭石，主要产区为張




图96 赭石

专龙关县，邯专的邢台县也有出产，但不如龙关产的体松、釘多、质量好。赭石因系矿产，尚无可靠的蕴藏量，1657年开采量为七十余万斤，价值三万五千余元。

赭石有补血作用和輕微的收敛作用，粘土有吸着作用，可以鎮吐和止血，可以制止嘔吐反胃，治疗貧血、萎黃和其他血色素缺少，以及鼻出血、胃出血、腸出血、子宫出血、尿血等症，除此以外，还治慢性下痢、赤白帶下及痔漏脫肛等。

## 馬 勃

馬勃俗名是馬糞包、馬皮袍、馬屁包。我省各地均产，以承专、張专产量較多。全省蕴藏量約一万斤，年产量約四千斤，价值八千余元。馬勃是一种黑穗菌类的东西，夏季生长在山林阴地，草原坡崗等地，剛生的时候为白色，好象一个饅头，熟了干枯以后，就变成暗褐色，质量很輕，非常柔軟，熟透了以后，一碰就冒尘烟，个大小如飯碗（如图97）。

每年夏秋之間可以到山中撿拾，撿拾时須注意：白皮的



图97 馬勃

不熟，不要采；熟透了粉就飞了，只剩了一层皮。最好是外皮一发黄就拾，过早过晚都不适宜。山野中还有一种类似馬勃的东西，俗名鴨糞包、羊糞包、屁崩子，熟后用手掰开一冒烟就没东西了，不能入药。

馬勃有止血效力。用于止血，可治吐血、咯血、衄血及外伤出血。用于消炎，可治扁桃腺炎、声带炎及喉头炎。用于退肿，可治疮瘍肿痛。

中科院植物所图书馆



S0022273



62.3073 申嘉木材手冊 02141

548

62.31

144 1859.9.28

568

1859.9.28

1859.9.28

62.31<sup>31</sup>73

548

02141



# 中 药 材 手 册

張家口專員公署商业局药材經理



河北人民出版社出版（保定市裕华

河北省书刊营业許可証第三号

河北人民印刷厂印刷

河北省新华书店发行



1959年1月第一版 1959年1月第一

787×1092耗 $1\frac{1}{32}$ ·3 $\frac{1}{4}$ 印張·71,000字

印数:1—10,000册 定价:(7)0.30元

統一书号: T 14086·48